



Chirimoyo
HUMEDAL · ORIZABA

GUÍA DE CAMPO
Edición 2026

HUMEDAL DE AGUA DULCE · VERACRUZ, MÉXICO

Catálogo de aves del humedal de *Chirimoyo*

— Comunidad Chirimoyo · Orizaba, Veracruz

EGRETTA THULA

«64 especies que sostienen la vida del humedal»

64

especies documentadas
VERSIÓN 2026

Proyecto comunitario
de conservación del humedal





Un humedal vivo, ave por ave

El humedal de *Chirimoyo*, es una laguna urbana al norte de Orizaba que filtra el agua, amortigua las inundaciones y da refugio a decenas de especies. Es una de las últimas zonas húmedas vivas de la ciudad.

Esta guía reúne las aves que la comunidad ha observado y documentado. Cada ficha resume, en una sola página, lo esencial para reconocer un ave en el campo y entender su papel en el ecosistema. Consévala seca, llévala al campo y compártela: conocer estas especies es el primer paso para defender el humedal.

CÓMO USAR ESTA GUÍA



Observa y compara

Fíjate en tamaño, color, pico y dónde está el ave.



Lee la ficha

Las insignias resumen estatus, rareza y protección.



Mira más en línea

Escanea el QR de cada ficha: más fotos, cantos y su mapa.

Cómo leer la ficha

SISTEMA DE INSIGNIAS

Estatus migratorio

PRESENCIA

- Residente** Vive en el humedal todo el año.
- Migratoria de invierno** Visita en la temporada fría.
- Migratoria de verano** Llega a reproducirse en la época cálida.
- Transitoria** Solo de paso durante la migración.

Grado de ocurrencia

QUÉ TAN SEGUIDO

- Común** Se observa con facilidad en cada visita.
- Poco común** Aparece de vez en cuando.
- Rara** Registros escasos o esporádicos.

Distribución

ORIGEN

- Nativa** Propia de la región de forma natural.
- Introducida** Traída por el ser humano, no nativa.

Conservación

IUCN • NOM-059

- IUCN **LC** IUCN **NT** IUCN **VU**
IUCN **EN** IUCN **CR**

Lista Roja: de **LC** (preocupación menor) a **CR** (peligro crítico).

- NOM-059 **Pr** NOM-059 **A** NOM-059 **P**
NOM-059 **E**

Norma mexicana: **Pr** sujeta a protección, **A** amenazada, **P** en peligro, **E** probablemente extinta. «—» sin categoría.

CONSULTA EN LÍNEA

Fichas ampliadas, cantos y mapas de cada especie, y cómo sumarte a la defensa del humedal.



Índice de especies

64 aves del humedal, agrupadas por gremio

64
ESPECIES

6
GREMIOS

Vadeadoras

● 12 esp.

Avetoro Norteño	<i>Botaurus lentiginosus</i>	01
Garcita Verde	<i>Butorides virescens</i>	02
Garza Azul	<i>Egretta caerulea</i>	03
Garza Blanca	<i>Ardea alba</i>	04
Garza Corona Negra	<i>Nycticorax nycticorax</i>	05
Garza Dedos Dorados	<i>Egretta thula</i>	06
Garza Ganadera	<i>Bubulcus ibis</i>	07
Garza Morena	<i>Ardea herodias</i>	08
Ibis Blanco	<i>Eudocimus albus</i>	09
Ibis Ojos Rojos	<i>Plegadis chihi</i>	10
Polluela Rojiza	<i>Laterallus ruber</i>	11
Rascón Nuca Canela	<i>Aramides albiventris</i>	12

Nadadoras

● 13 esp.

Cerceta Alas Azules	<i>Spatula discors</i>	13
Cormorán Neotropical	<i>Nannopterum brasilianum</i>	14
Gallareta Americana	<i>Fulica americana</i>	15

Gallineta Frente Roja	<i>Gallinula galeata</i>	16
Gallineta Morada	<i>Porphyrio martinicus</i>	17
Pato Boludo Menor	<i>Aythya affinis</i>	18
Pato Cabeza Roja	<i>Aythya americana</i>	19
Pato Coacoxtle	<i>Aythya valisineria</i>	20
Pato Cucharón Norteño	<i>Spatula clypeata</i>	21
Pato Tepalcate	<i>Oxyura jamaicensis</i>	22
Pijije Alas Blancas	<i>Dendrocygna autumnalis</i>	23
Zambullidor Menor	<i>Tachybaptus dominicus</i>	24
Zambullidor Pico Grueso	<i>Podilymbus podiceps</i>	25

Playeras

● 4 esp.

Agachadiza de Wilson	<i>Gallinago delicata</i>	26
Candelero Americano	<i>Himantopus mexicanus</i>	27
Chorlo Tildío	<i>Charadrius vociferus</i>	28
Playero Alzacolita	<i>Actitis macularius</i>	29

Voladoras

● 7 esp.

Golondrina Alas Aserradas	<i>Stelgidopteryx serripennis</i>	30
---------------------------	-----------------------------------	----

Golondrina Tijereta	<i>Hirundo rustica</i>	31
Luis Bienteveo	<i>Pitangus sulphuratus</i>	32
Martín Pescador Norteño	<i>Megasceryle alcyon</i>	33
Mosquero Cardenal	<i>Pyrocephalus rubinus</i>	34
Tirano Tropical	<i>Tyrannus melancholicus</i>	35
Vencejo de Vaux	<i>Chaetura vauxi</i>	36

Rapaces y Carroñeras ● 4 esp.

Aguililla Caminera	<i>Rupornis magnirostris</i>	37
Halcón Murcielaguero	<i>Falco rufigularis</i>	38
Zopilote Aura	<i>Cathartes aura</i>	39
Zopilote Común	<i>Coragyps atratus</i>	40

Terrestres ● 24 esp.

Carpintero Cheje	<i>Melanerpes aurifrons</i>	41
Chara Pea	<i>Cyanocorax morio</i>	42
Chipe Amarillo	<i>Setophaga petechia</i>	43
Chipe Charquero	<i>Parkesia noveboracensis</i>	44
Chipe Corona Negra	<i>Cardellina pusilla</i>	45
Chipe Trepador	<i>Mniotilta varia</i>	46
Colibrí Berilo	<i>Saucerottia beryllina</i>	47
Gorrión Pantanero	<i>Melospiza georgiana</i>	48
Mascarita Común	<i>Geothlypis trichas</i>	49
Mirlo Pardo	<i>Turdus grayi</i>	50
Oropéndola Cabeza Castaña	<i>Psarocolius wagleri</i>	51
Oropéndola de Moctezuma	<i>Psarocolius montezuma</i>	52
Paloma Turca	<i>Streptopelia decaocto</i>	53

Papamoscas Negro	<i>Sayornis nigricans</i>	54
Parula Tropical	<i>Setophaga pitiayumi</i>	55
Perlita Azulgris	<i>Poliophtila caerulea</i>	56
Saltador Cabeza Negra	<i>Saltator atriceps</i>	57
Saltador Gris	<i>Saltator grandis</i>	58
Semillero Brincador	<i>Volatinia jacarina</i>	59
Semillero de Collar	<i>Sporophila moreletti</i>	60
Tángara Aliamarilla	<i>Thraupis abbas</i>	61
Tórtola Colilarga	<i>Columbina inca</i>	62
Vireo Anteojillo	<i>Vireo solitarius</i>	63
Zanate Mayor	<i>Quiscalus mexicanus</i>	64

Avetoro Norteño

Botaurus lentiginosus (Rackett, 1813)



OTROS NOMBRES Avetoro Lentiginoso · Avetoro Americano



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

● ESTATUS Migratoria de invierno

● OCURRENCIA Rara

● DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

A

TAXONOMÍA

ORDEN

Pelecaniformes

FAMILIA

Ardeidae

GÉNERO

Botaurus

MEDIDAS

TAMAÑO

58–85
cm

PESO

370–1072
g

ENVERGADURA

92–115
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Humedales con vegetación densa

⌚ Amanecer y atardecer

Descripción

Garza solitaria y reservada de los humedales norteamericanos. Su librea parda y beige, finamente jaspeada, la funde con los juncos; ante el peligro estira el cuello y queda inmóvil, casi invisible. Mide de 59 a 70 cm, con envergadura cercana a 105 cm. Come peces, ranas e insectos. En invierno se desplaza a latitudes más cálidas.

¿Sabías que?

Es célebre por su extraña vocalización de reclamo, un profundo sonido gutural de bombeo ('pump-er-lunk') que parece resonar bajo el agua; su coloración y postura críptica lo convierten en una de las garzas más difíciles de avistar.

Cómo identificarla

Garza mediana, compacta y críptica, de coloración pardo-leonada con fino veteado; presenta una distintiva franja negra a los lados del cuello. Al sentirse amenazada apunta el pico al cielo y se inmoviliza, confundiendo con los juncos verticales, lo que dificulta su observación.

Dónde y cuándo observarla

Búsqese oculto e inmóvil dentro del tular denso y la vegetación palustre de las orillas de la laguna (estimado). Presencia principal: Octubre a marzo (estimado).



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Garcita Verde

Butorides virescens (Linnaeus, 1758)



OTROS NOMBRES Garza Verde · Garcita Verdosa · Garcilla Verde · Joito



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

ESTATUS Residente

OCURRENCIA Común

DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Pelecaniformes

FAMILIA

Ardeidae

GÉNERO

Butorides

MEDIDAS

TAMAÑO

40–48
cm

PESO

184–211
g

ENVERGADURA

62–70
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Orillas de ríos, lagunas y manglares

⌚ Amanecer y atardecer

Descripción

Pequeña garza de humedales, ríos y lagunas de Norteamérica y Centroamérica. Con 41 a 46 cm, combina verdes y grises y exhibe una corona oscura. Es famosa por una astuta táctica de pesca: deja caer palitos o insectos sobre el agua como cebo para atraer peces. Come peces, anfibios e insectos acuáticos. Solitaria, es una pieza clave del humedal.

¿Sabías que?

Es uno de los escasos ejemplos de aves que utilizan herramientas: deja caer plumas, insectos o pequeños objetos sobre el agua como cebo para atraer peces hacia su alcance.

Cómo identificarla

Garza pequeña y rechoncha de cuello corto, con dorso verde azulado oscuro, cuello castaño rufo y patas anaranjadas o amarillentas. Su tamaño reducido, postura agazapada y coloración oscura la distinguen fácilmente de las garzas blancas y de mayor talla.

Dónde y cuándo observarla

Búsquese agazapada sobre ramas bajas o troncos en la orilla vegetada y bordes de tular de la laguna (estimado). Presente todo el año.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Garza Azul

Egretta caerulea (Linnaeus, 1758)

OTROS NOMBRES Garceta Azul · Garcita Azul · Garceta Morena



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

ESTATUS Residente

OCURRENCIA Común

DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Pelecaniformes

FAMILIA

Ardeidae

GÉNERO

Egretta

MEDIDAS

TAMAÑO

56–74
cm

PESO

315–410
g

ENVERGADURA

100–105
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Humedales, marismas y manglares

⌚ Primeras horas de la mañana

Descripción

Estilizada garza de lagunas, esteros y ríos. De joven viste todo de blanco, lo que la confunde con otras garzas claras, pero al madurar adopta un azul grisáceo y un pico oscuro de base azulada. Mide entre 56 y 74 cm y come peces, anfibios e insectos en aguas someras. Su cambio de color a lo largo de la vida la vuelve fascinante de observar.

¿Sabías que?

Los individuos jóvenes son completamente blancos y atraviesan un llamativo plumaje moteado o 'pío' (parches blancos y azules) durante la transición al plumaje adulto, lo que ha generado frecuentes confusiones de identificación.

Cómo identificarla

El adulto es uniformemente azul pizarra con cabeza y cuello púrpura vinoso, y pico gris azulado con punta negra. Los juveniles son blancos y pueden confundirse con la Garza Dedos Dorados, pero se distinguen por el pico bicolor (base pálida, punta oscura) y patas verdosas en vez de negras.

Dónde y cuándo observarla

Búsquese caminando despacio en aguas someras y bordes fangosos de la laguna (estimado). Presente todo el año.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Garza Blanca

Ardea alba Linnaeus, 1758



OTROS NOMBRES Garzón Blanco · Garza Grande · Garza Real · Garceta Grande · Garza Blanca Grande



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

ESTATUS Residente

OCURRENCIA Común

DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Pelecaniformes

FAMILIA

Ardeidae

GÉNERO

Ardea

MEDIDAS

TAMAÑO

80–104
cm

PESO

700–1500
g

ENVERGADURA

131–170
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Humedales, marismas y orillas acuáticas

⌚ Amanecer y atardecer

Descripción

Llamada también garza real, es una imponente zancuda de humedales presente en buena parte del planeta. Alcanza de 80 a 100 cm, con plumaje blanco y esbelto cuello en 'S'. En reproducción le brotan finas plumas ornamentales en el dorso. El pico es amarillo y las patas negras. Acecha en aguas someras y atrapa peces, anfibios e insectos con elegancia.

¿Sabías que?

Durante la temporada reproductiva desarrolla largas plumas ornamentales en el dorso; la caza histórica de estas plumas para la moda llevó a fuertes declives a inicios del siglo XX y motivó algunos de los primeros movimientos conservacionistas.

Cómo identificarla

Garza grande totalmente blanca con pico amarillo y patas y pies negros, lo que la distingue de la Garza Dedos Dorados (pico negro, pies amarillos) y de la fase blanca de la Garza Azul (pico bicolor). El cuello es largo y forma una marcada 'S' al replegarse.

Dónde y cuándo observarla

Búsquese en aguas abiertas y someras de la orilla de la laguna y en bordes fangosos despejados (estimado). Presente todo el año.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Garza Corona Negra

Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)



OTROS NOMBRES Garza Nocturna Corona Negra · Pedrete Corona Negra · Huaco · Garza Bruja · Guaco



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

● **ESTATUS** Residente

● **OCURRENCIA** Poco común

● **DISTRIBUCIÓN** Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Pelecaniformes

FAMILIA

Ardeidae

GÉNERO

Nycticorax

MEDIDAS

TAMAÑO

58–65
cm

PESO

730–1010
g

ENVERGADURA

105–112
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Humedales arbolados, marismas y manglares

⌚ Amanecer y atardecer

Descripción

Garza crepuscular y nocturna cuyo nombre alude a la negra corona de su cabeza, en contraste con el cuerpo gris y blanco. Mide de 58 a 65 cm y tiene patas largas amarillo verdosas. A diferencia de sus parientes diurnas, forrajea al anochecer y al amanecer, cuando captura peces, anfibios, mamíferos e insectos. Su discreción la hace poco visible.

¿Sabías que?

Es una garza de hábitos predominantemente nocturnos y crepusculares, lo que la hace pasar inadvertida durante el día mientras descansa oculta entre el follaje.

Cómo identificarla

El adulto tiene corona y dorso negro azulado que contrastan con frente, cuello y partes inferiores blanquecino grisáceas, ojos rojos y patas amarillentas; en reproducción luce dos o tres plumas blancas en la nuca. Es robusto, de cuello corto, aspecto rechoncho y cabeza grande. Los juveniles son pardos y moteados.

Dónde y cuándo observarla

Buscarla posada y discreta entre la vegetación riparia, tulares y ramas bajas de árboles a la orilla de la laguna, especialmente al amanecer y al atardecer (estimado). Presente todo el año.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Garza Dedos Dorados

Egretta thula (Molina, 1782)



OTROS NOMBRES Garceta Nívea · Garcita Blanca · Garza Patiamarilla · Garceta Pie Dorado · Chusmita



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

ESTATUS Residente

OCURRENCIA Común

DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Pelecaniformes

FAMILIA

Ardeidae

GÉNERO

Egretta

MEDIDAS

TAMAÑO

56–66
cm

PESO

352–475
g

ENVERGADURA

84–105
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Humedales, marismas y orillas costeras

⌚ Primeras horas de la mañana

Descripción

Conocida también como garza nívea, es una grácil zancuda de humedales y litorales desde Estados Unidos hasta Sudamérica. Su plumaje es blanco, con plumas finas en cabeza, pecho y dorso al criar. Mide de 56 a 66 cm; las patas son negras y los pies de un vivo amarillo que la identifica. Remueve el agua con los pies para espantar a sus presas.

¿Sabías que?

Sus brillantes pies amarillos contrastando con las patas negras le dan el apodo de 'la garza de las zapatillas doradas'; los usa de forma activa para remover el sustrato y delatar a sus presas. Al igual que la Garza Blanca, fue intensamente cazada por sus plumas ornamentales.

Cómo identificarla

Garza blanca esbelta de talla media, con pico negro delgado, lores amarillos, patas negras y pies de un característico amarillo brillante ('zapatillas doradas'). Se distingue de la Garza Blanca por su menor tamaño, pico negro y pies amarillos, y de la Garza Ganadera por su silueta esbelta y pico fino.

Dónde y cuándo observarla

Búsqese activa en aguas someras y orillas fangosas abiertas de la laguna, agitando los pies al forrajear (estimado). Presente todo el año.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org





Garza Ganadera

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)

OTROS NOMBRES Garza Vaquera · Garcilla Bueyera · Garza Bueyera · Espulgabuey · Garza Boyera



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

ESTATUS Residente

OCURRENCIA Común

DISTRIBUCIÓN Introducida

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Pelecaniformes

FAMILIA

Ardeidae

GÉNERO

Bubulcus

MEDIDAS

TAMAÑO
46–56
cm

PESO
270–512
g

ENVERGADURA
88–96
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Pastizales y campos con ganado

⌚ Primeras horas de la mañana

Descripción

Garza de talla pequeña a mediana, célebre por acompañar al ganado. Oriunda de África y Asia, colonizó otras regiones, entre ellas América, donde es no nativa. Mide entre 46 y 56 cm; su plumaje es blanco y adquiere tonos anaranjados en cabeza, pecho y espalda en reproducción. Su expansión inquieta por desplazar especies locales.

¿Sabías que?

Es un caso notable de colonización natural: cruzó el Atlántico desde África por sus propios medios y se estableció en América sin intervención humana directa, expandiéndose rápidamente gracias a la ganadería.

Cómo identificarla

Garza blanca pequeña y compacta, de cuello corto y pico amarillo relativamente grueso; en plumaje reproductivo presenta tonos anaranjado-canela en corona, pecho y dorso. Su postura achaparrada y su asociación con ganado en pastizales la distinguen de las demás garzas blancas.

Dónde y cuándo observarla

Búsquese en pastizales y zonas abiertas circundantes a la laguna, frecuentemente posada sobre o junto al ganado (estimado). Presente todo el año.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Garza Morena

Ardea herodias Linnaeus, 1758



OTROS NOMBRES Garza Azul · Garzón Azulado · Garzón Cenizo · Garza Azulada · Garza Ceniza



(c) Vicencio de la Cruz-Francisco, some rights reserved
(CC BY-SA)

CC BY-SA
4.0

ESTADO

● ESTATUS Migratoria de invierno

● OCURRENCIA Rara

● DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Pelecaniformes

FAMILIA

Ardeidae

GÉNERO

Ardea

MEDIDAS

TAMAÑO

91–137
cm

PESO

1820–3600
g

ENVERGADURA

167–201
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Humedales, marismas, lagunas y costas

⌚ Amanecer y atardecer

Descripción

Garza más grande de Norteamérica, con hasta 1.3 m de estatura y cerca de 2 m de envergadura. Viste gris azulado, con tonos pardos en el cuello y una línea negra en la zona del ojo. Discreta y calmada, atrapa peces, anfibios e insectos en aguas someras. Acude a la Laguna del Chirimoyo solo en la estación fría. La amenaza el deterioro del humedal.

¿Sabías que?

Pese a su gran tamaño, es un ave sigilosa y solitaria; en vuelo repliega el cuello en forma de 'S' y bate las alas con lentitud, emitiendo a veces un fuerte y ronco graznido al ser sorprendida.

Cómo identificarla

Garza muy grande de plumaje gris azulado, cuello largo grisáceo con estrías frontales, corona blanca con franja negra que termina en plumas nucales, y muslos rufos. Su gran tamaño y coloración gris la distinguen claramente de la Garza Azul, mucho más pequeña y de tono azul pizarra uniforme.

Dónde y cuándo observarla

Búsquese solitaria, quieta en la orilla de aguas abiertas y someras o en bordes de tular de la laguna (estimado). Presencia principal: Octubre a abril (estimado).



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.


FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Ibis Blanco

Eudocimus albus (Linnaeus, 1758)

OTROS NOMBRES Coco · Coco Blanco · Corocoro · Corocoro Blanco



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

● ESTATUS Transitoria

● OCURRENCIA Rara

● DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Pelecaniformes

FAMILIA

Threskiornithidae

GÉNERO

Eudocimus

MEDIDAS

TAMAÑO

53–71
cm

PESO

750–1050
g

ENVERGADURA

90–105
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Humedales, marismas y manglares costeros

🕒 Primeras horas de la mañana

Descripción

Ave zancuda de tamaño medio que llega a 70 cm de alto y 105 cm de envergadura. El plumaje adulto es blanco, con patas y un largo pico curvo rosado anaranjado; los jóvenes son pardos. Sondea las aguas someras en busca de pececillos, insectos y crustáceos, guiándose por el tacto. En la laguna su aparición es escasa y suele darse en pequeños grupos.

¿Sabías que?

El característico color rojo intenso de su cara y pico se aviva durante la temporada reproductiva; su presencia en humedales de montaña es excepcional, pues prefiere ambientes costeros.

Cómo identificarla

El adulto es inconfundible: plumaje totalmente blanco con las puntas de las primarias negras (visibles en vuelo), piel facial y pico largo y curvo de color rojo rosado, y patas rosadas. Los juveniles son pardos por arriba con vientre y obispillo blancos. Se distingue de las garzas blancas por el pico decurvado.

Dónde y cuándo observarla

Buscarlo recorriendo las orillas fangosas y zonas someras de la laguna donde sondea el lodo en busca de alimento (estimado). Presencia principal: Octubre a abril (estimado).



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org




Ibis Ojos Rojos

Plegadis chihi (Vieillot, 1817)



OTROS NOMBRES Morito Cariblanco · Ibis de Cara Blanca · Cuervillo de Cañada · Cuervo de Pantano



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

● ESTATUS Migratoria de invierno

● OCURRENCIA Poco común

● DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Pelecaniformes

FAMILIA

Threskiornithidae

GÉNERO

Plegadis

MEDIDAS

TAMAÑO

46–56
cm

PESO

450–525
g

ENVERGADURA

90–93
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Humedales, marismas y pastizales inundados

🕒 Primeras horas de la mañana

Descripción

Elegante ibis de talla media que frecuenta humedales, lagunas y zonas pantanosas. Mide de 51 a 66 cm y luce un plumaje entre pardo y bronce con reflejos iridiscentes. En reproducción aparece una fina línea blanca en la base de su pico curvo, rasgo que le da nombre. Hurga el fango para extraer invertebrados. En el Chirimoyo se ve en grupos chicos.

¿Sabías que?

El borde facial de plumas blancas y los ojos rojos son los rasgos que dan origen a su nombre común y permiten distinguirlo de su pariente cercano, el Ibis Cara Oscura.

Cómo identificarla

De aspecto oscuro, en buena luz muestra plumaje castaño rojizo con brillos iridiscentes verdes, bronce y púrpura, pico largo y curvo y ojos rojos. En reproducción exhibe un borde de plumas blancas que rodea la piel facial rojiza, rasgo clave para separarlo del muy similar Ibis Cara Oscura. A distancia se ve casi negro.

Dónde y cuándo observarla

Buscarlo forrajeando en grupos sobre orillas fangosas, zonas inundadas y vegetación somera del humedal (estimado). Presencia principal: Octubre a abril, con posibilidad de registros dispersos en otras épocas (estimado).



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA

en línea · fauna.chirimoyo.org



Polluela Rojiza

Laterallus ruber (Sclater & Salvin, 1860)



OTROS NOMBRES Polluela Canela · Polluela Colorada · Burrito Colorado · Gallineta Colorada



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

ESTATUS Residente

OCURRENCIA Rara

DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

Pr

TAXONOMÍA

ORDEN

Gruiformes

FAMILIA

Rallidae

GÉNERO

Laterallus

MEDIDAS

TAMAÑO

14–16.5
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Marismas de agua dulce y zonas inundables

Amanecer y atardecer

Descripción

Pequeño ráldo de 14 a 16 cm, de cuerpo compacto y rechoncho. Su plumaje es uniforme, de cálido castaño rojizo o canela casi en todo el cuerpo, único ráldo pequeño casi enteramente rufo. La corona tiende a grisáceo, el pico es corto y oscuro y las patas pueden ser rojizas. Muy discreto, se detecta más por su voz que a la vista en el tular denso.

¿Sabías que?

Pese a su escasez aparente, es más común de lo que sugieren los registros visuales, ya que su naturaleza esquiva hace que casi siempre se detecte solo por su característico trino, y figura como sujeta a protección especial en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Cómo identificarla

El color castaño rojizo uniforme del cuerpo y la talla muy pequeña la identifican como el único ráldo casi enteramente rufo de su área. Su trino descendente y explosivo es inconfundible y suele ser la mejor forma de detectarla. Se le ve rara vez y solo por instantes cuando cruza claros entre la vegetación densa.

Dónde y cuándo observarla

Buscarla en el interior del tular denso, los pastizales húmedos y la vegetación palustre espesa al borde de la laguna (estimado). Presente todo el año.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Rascón Nuca Canela

Aramides albiventris Lawrence, 1868



OTROS NOMBRES Cotara Ventriblanca · Rascón Cuelligrís · Chirincoco · Cocaleca · Pone-pone



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

● **ESTATUS** Residente

● **OCURRENCIA** Poco común

● **DISTRIBUCIÓN** Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Gruiformes

FAMILIA

Rallidae

GÉNERO

Aramides

MEDIDAS

TAMAÑO

33–40
cm

PESO

450–600
g

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Bosques pantanosos, manglares y arroyos

⌚ Amanecer y atardecer

Descripción

Ave rálida de porte mediano, de 38 a 40 cm. Luce dorso y alas verde oliva, cuello y pecho grises y vientre blanco; sus largas patas rojas le sirven para moverse sobre el lodo y entre la vegetación. Omnívoro, come invertebrados, semillas, frutos y brotes. Esquivo, delata su presencia con potentes llamados al alba y al ocaso.

¿Sabías que?

Es un ave esquiva más fácil de detectar por su voz que por la vista; emite un fuerte y resonante coro de gritos repetidos, a menudo al amanecer o al anochecer, que delata su presencia en la vegetación densa.

Cómo identificarla

Rascón robusto con dorso pardo oliváceo, pecho rufo canela, nuca y cuello gris ceniza, vientre negruzco y patas rojo coral; el pico es amarillo verdoso. Se distingue de otros rálidos por su mayor tamaño, coloración contrastante y comportamiento de caminar erguido en la maleza, más que por el vuelo.

Dónde y cuándo observarla

Búsquese al amanecer o atardecer en orillas fangosas con tular denso y vegetación ribereña baja en los bordes de la laguna (estimado). Presente todo el año.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Cerceta Alas Azules

Spatula discors (Linnaeus, 1766)



OTROS NOMBRES Cerceta aliazul · Pato media luna · Pato de alas azules



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

● ESTATUS Migratoria de invierno

● OCURRENCIA Poco común

● DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Anseriformes

FAMILIA

Anatidae

GÉNERO

Spatula

MEDIDAS

TAMAÑO

37–41
cm

PESO

280–410
g

ENVERGADURA

58–62
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Charcas y humedales someros

⌚ Amanecer y atardecer

Descripción

Cerceta pequeña y migratoria (36-41 cm), repartida por Norteamérica. En vuelo sobresalen los parches azul celeste de sus alas y un espejuelo verde tornasolado; el macho luce una media luna blanca en la cara, mientras la hembra es parda. Se alimenta de plantas acuáticas, semillas e insectos. En invierno viaja al sur, hasta Sudamérica.

¿Sabías que?

Es uno de los primeros patos en migrar al sur en otoño y de los últimos en regresar al norte en primavera, recorriendo distancias notables que pueden alcanzar Sudamérica.

Cómo identificarla

Pato pequeño y esbelto; el macho reproductor muestra una media luna blanca vertical en la cara gris azulada y flancos canela moteados. La hembra es parda y críptica, difícil de separar de otras cercetas, pero ambos sexos exhiben un parche azul celeste en la cobertora alar visible al vuelo. Se distingue del Pato Cucharón por su pico más corto.

Dónde y cuándo observarla

Aguas someras cercanas a la orilla y entre la vegetación emergente del tular, donde nada filtrando en la superficie (estimado).

Presencia principal: Octubre a abril (estimado).



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org




Cormorán Neotropical

Nannopterum brasilianum (Gmelin, 1789)



OTROS NOMBRES Cormorán Biguá · Cormorán Oliváceo · Biguá · Corúa de Agua Dulce · Pato Yeco



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

● **ESTATUS** Residente

● **OCURRENCIA** Poco común

● **DISTRIBUCIÓN** Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Suliformes

FAMILIA

Phalacrocoracidae

GÉNERO

Nannopterum

MEDIDAS

TAMAÑO

63–71
cm

PESO

1100–1500
g

ENVERGADURA

100–110
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Cuerpos de agua dulce y costeros

⌚ Amanecer y atardecer

Descripción

Ave acuática de talla media (70–75 cm), de plumaje oscuro con reflejos verdosos y llamativos ojos esmeralda. Tiene pico ganchudo y cola larga. Bucea con gran pericia para pescar. Tras nadar se posa con las alas abiertas al sol para secarlas y desparasitarse, conducta que lo hace inconfundible en sus refugios.

¿Sabías que?

Aunque la guía local lo registra como migratorio, en México es fundamentalmente residente con desplazamientos locales según la disponibilidad de agua y alimento; con frecuencia se le ve posado con las alas abiertas al sol.

Cómo identificarla

Cormorán esbelto y enteramente negruzco con cola larga; el adulto reproductor muestra un borde blanco que delimita la piel facial amarillenta en forma de V detrás del pico. Se distingue del cormorán de doble cresta por su menor tamaño, cola proporcionalmente más larga y la zona gular más reducida y angulada. Ambos sexos son similares.

Dónde y cuándo observarla

Aguas abiertas de la laguna para bucear y árboles o ramas secas circundantes y orillas, donde percha a secar las alas (estimado). Presente todo el año.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA

en línea · fauna.chirimoyo.org



Gallareta Americana

Fulica americana Gmelin, 1789



OTROS NOMBRES Focha americana · Gallareta de pico blanco



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

ESTATUS Residente

OCURRENCIA Común

DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Gruiformes

FAMILIA

Rallidae

GÉNERO

Fulica

MEDIDAS

TAMAÑO

34-43
cm

PESO

427-848
g

ENVERGADURA

58-71
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Lagunas y aguas abiertas con vegetación

⌚ Amanecer y atardecer

Descripción

Ave acuática habitual en el Chirimoyo, fácil de reconocer por su cuerpo negro, el pico blanco y el escudo frontal rojizo. Mide de 34 a 43 cm y posee dedos lobulados que le permiten nadar con soltura, aunque también camina bien en tierra. Es muy territorial al reproducirse. Su dieta incluye plantas acuáticas, insectos e invertebrados.

¿Sabías que?

Aunque nada como un pato, pertenece a la familia de los rálidos; al despegar corretea sobre el agua batiendo las alas antes de alzar el vuelo.

Cómo identificarla

Cuerpo regordete gris pizarra a negruzco con pico blanco y un escudete frontal blanquecino rematado por una mancha rojiza; muestra un parche blanco bajo la cola. Se distingue de las gallinetas por el pico totalmente blanco (no rojo) y por sus dedos lobulados. Ambos sexos son similares.

Dónde y cuándo observarla

Espejo de agua abierto y bordes del tular, donde nada en grupos y se desplaza entre la vegetación emergente y las orillas (estimado). Presente todo el año.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Gallineta Frente Roja

Gallinula galeata (Lichtenstein, 1818)



OTROS NOMBRES Gallineta común · Polla de agua · Gallareta frentirroja



(c) Adrianh M. Orozco, some rights reserved (CC BY)

CC BY 4.0

ESTADO

ESTATUS Residente

OCURRENCIA Poco común

DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Gruiformes

FAMILIA

Rallidae

GÉNERO

Gallinula

MEDIDAS

TAMAÑO

32–35
cm

PESO

192–493
g

ENVERGADURA

54–62
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Humedales con vegetación densa

⌚ Amanecer y atardecer

Descripción

Ave acuática de talla media identificable por su plumaje gris muy oscuro a negro, el escudo frontal rojo que le da nombre y el pico amarillo. Mide de 36 a 40 cm. Aunque gregaria, se vuelve muy territorial en la cría. Come sobre todo plantas acuáticas y pequeños invertebrados, valiéndose de sus robustas patas lobuladas para nadar.

¿Sabías que?

Fue separada de la gallineta común del Viejo Mundo (*Gallinula chloropus*) como especie propia de América; sus crías presentan pequeños espolones en las alas que les ayudan a trepar entre la vegetación.

Cómo identificarla

Ave acuática gris pizarra a negruzca con un llamativo escudete frontal y base del pico rojo intenso rematado en amarillo, además de una línea blanca a lo largo del flanco. Se distingue de la gallareta por el pico rojo (no blanco) y por carecer de dedos lobulados. Ambos sexos son similares.

Dónde y cuándo observarla

Borde del tular y vegetación riparia densa, donde nada o camina cerca de la cobertura, asomándose entre los juncos (estimado). Presente todo el año.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Gallineta Morada

Porphyrio martinicus (Linnaeus, 1766)



OTROS NOMBRES Calamoncillo americano · Polla azul · Gallareta morada



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

ESTATUS Residente

OCURRENCIA Poco común

DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Gruiformes

FAMILIA

Rallidae

GÉNERO

Porphyrio

MEDIDAS

TAMAÑO

26–37
cm

PESO

141–305
g

ENVERGADURA

50–61
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Pantanos con vegetación flotante

⌚ Amanecer y atardecer

Descripción

Ave acuática mediana y de colorido espectacular. El adulto tiene cabeza, cuello y partes inferiores azul púrpura, dorso verde bronceado, pico rojo con punta amarilla y escudo frontal celeste pálido. Sus larguísimos dedos amarillos le permiten caminar sobre la vegetación flotante. En el humedal frecuenta orillas con vegetación emergente densa.

¿Sabías que?

Sus dedos desproporcionadamente largos le permiten repartir el peso y caminar sobre hojas flotantes como los nenúfares, dándole un aspecto casi acrobático sobre el agua.

Cómo identificarla

Busca el azul púrpura intenso con dorso verdoso, el pico rojo de punta amarilla con escudo frontal celeste y, sobre todo, las grandes patas amarillas. Camina sobre la vegetación flotante mostrando el infracaudal blanco al levantar la cola. Los juveniles, pardo dorados, pueden confundirse pero conservan la silueta y las patas largas.

Dónde y cuándo observarla

Orillas de la laguna con tular y vegetación acuática flotante o emergente densa, por donde camina y trepa entre los tallos (estimado). Presente todo el año.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org




Pato Boludo Menor

Aythya affinis (Eyton, 1838)



OTROS NOMBRES Porrón bola · Porrón menor · Pato canadiense



(c) MarvalPhotography19, some rights reserved (CC BY)

CC BY 4.0

ESTADO

● ESTATUS Migratoria de invierno

● OCURRENCIA Poco común

● DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Anseriformes

FAMILIA

Anatidae

GÉNERO

Aythya

MEDIDAS

TAMAÑO

38–48
cm

PESO

454–1090
g

ENVERGADURA

68–78
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Lagunas y aguas abiertas

⌚ Amanecer y atardecer

Descripción

Pato buceador de talla media (38–46 cm), de cabeza redondeada y plumaje contrastado. El macho luce dorso blanco con fino veteado negro y flancos de blanco brillante; la hembra es más sobria, en tonos pardos. Bucea en aguas someras para comer plantas acuáticas, moluscos e insectos. Su presencia confirma el valor del humedal para las migratorias.

¿Sabías que?

Es el pato buceador más abundante y ampliamente distribuido como invernante en Norteamérica; suele asociarse en bandadas con otras especies de su género.

Cómo identificarla

El macho tiene cabeza negra con brillo púrpura o verdoso, pecho negro, flancos blanquecinos, dorso gris finamente vermiculado y ojo amarillo. La hembra es parda con mancha blanca definida en la base del pico. Se distingue del Pato Boludo Mayor por su perfil de corona anguloso, menor tamaño y menor blanco en el ala en vuelo.

Dónde y cuándo observarla

Buscarlo en las aguas abiertas y profundas de la laguna, donde suele formar grupos que bucean activamente (estimado). Presencia principal: Octubre a abril (estimado).



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org




Pato Cabeza Roja

Aythya americana (Eyton, 1838)



OTROS NOMBRES Porrón americano · Porrón cabecirrojo · Pato cabezón



(c) Nick Block, some rights reserved (CC BY)

CC BY 4.0

ESTADO

● ESTATUS Migratoria de invierno

● OCURRENCIA Rara

● DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Anseriformes

FAMILIA

Anatidae

GÉNERO

Aythya

MEDIDAS

TAMAÑO

37–56
cm

PESO

907–1600
g

ENVERGADURA

74–84
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Lagunas y marismas de agua dulce

⌚ Amanecer y atardecer

Descripción

Anátida acuática de talla media a grande (35-50 cm). En celo, el macho exhibe cabeza de intenso color canela, cuerpo gris y pecho negro, mientras la hembra viste un pardo discreto que la camufla bien. Hábil buceador, come vegetación acuática, semillas e invertebrados. Migra entre sus zonas de cría en Norteamérica y sus refugios en México.

¿Sabías que?

Cerca del 80% de la población norteamericana inverna en las lagunas Madre de Texas y Tamaulipas; su presencia en humedales de montaña del centro de Veracruz es ocasional.

Cómo identificarla

El macho tiene cabeza redondeada rojo cobrizo, ojo amarillo, pecho negro, dorso y flancos gris claro, y pico azulado con punta negra. La hembra es parda con cara pálida y anillo ocular tenue. Se distingue del Pato Coacoxtle por la cabeza redondeada (no en cuña) y el pico corto azulado, y del Pato Boludo por la cabeza rojiza y el dorso gris liso.

Dónde y cuándo observarla

Buscarlo en las aguas abiertas y profundas de la laguna, a menudo asociado a otros patos buceadores (estimado). Presencia principal: Noviembre a marzo (estimado).



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Pato Coacoxtle

Aythya valisineria (Wilson, 1814)



OTROS NOMBRES · Porrón coacoxtle · Porrón lomiblanco · Pato lomiblanco



(c) Xochitl Zambrano, some rights reserved (CC BY)

CC BY 4.0

ESTADO

● ESTATUS Migratoria de invierno

● OCURRENCIA Rara

● DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Anseriformes

FAMILIA

Anatidae

GÉNERO

Aythya

MEDIDAS

TAMAÑO

48–56
cm

PESO

862–1588
g

ENVERGADURA

79–89
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Lagunas y aguas abiertas extensas

⌚ Amanecer y atardecer

Descripción

Voluminoso pato buceador de Norteamérica. Los machos (48-60 cm) destacan por la cabeza rojiza, el largo pico negro y el lomo blanco que contrasta con el cuerpo oscuro; las hembras son más apagadas y pardas. Su dieta se centra en plantas sumergidas, en especial la Vallisneria, con moluscos e insectos. Inverna en sitios templados como el Chirimoyo.

¿Sabías que?

Su nombre científico valisineria deriva de la planta acuática Vallisneria americana, alimento clave en su dieta invernal; es el pato buceador de mayor tamaño del continente.

Cómo identificarla

El macho tiene cabeza y cuello castaño rojizo intenso, ojo rojo, pecho negro, dorso y flancos casi blancos, y un perfil de frente y pico en cuña. La hembra es parda con la misma silueta de cabeza acuñada. El perfil de frente baja que continúa con el pico largo y oscuro lo separa del Pato Cabeza Roja, de cabeza redondeada y pico azulado corto.

Dónde y cuándo observarla

Buscarlo en las aguas más abiertas y profundas de la laguna, donde bucea en busca de raíces y tubérculos (estimado). Presencia principal: Noviembre a marzo (estimado).



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org




Pato Cucharón Norteño

Spatula clypeata (Linnaeus, 1758)



OTROS NOMBRES Pato cuchara · Pato cucharón · Cuchara común



(c) Adrianh M. Orozco, some rights reserved (CC BY)

CC BY 4.0

ESTADO

● **ESTATUS** Migratoria de invierno

● **OCURRENCIA** Común

● **DISTRIBUCIÓN** Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN LC NOM-059 —

TAXONOMÍA

ORDEN	Anseriformes
FAMILIA	Anatidae
GÉNERO	<i>Spatula</i>

MEDIDAS

TAMAÑO

43–56
cm

PESO

400–1100
g

ENVERGADURA

70–85
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Lagunas y aguas someras

⌚ Amanecer y atardecer

Descripción

Pato de superficie inconfundible por su pico ancho y aplanado en forma de cuchara, ideal para filtrar el agua y atrapar invertebrados, semillas y plantas. Mide de 44 a 52 cm. El macho exhibe cabeza verde iridiscente, pecho blanco y flancos castaños; la hembra es parda y moteada. En el Chirimoyo regula invertebrados y dispersa semillas.

¿Sabías que?

Su pico contiene más de cien lamelas finas a cada lado que actúan como un colador, permitiéndole alimentarse del zooplancton suspendido en el agua de forma muy eficiente.

Cómo identificarla

Inconfundible por su gran pico espatulado, más largo que la cabeza. El macho reproductor luce cabeza verde oscuro, pecho blanco y flancos castaño rojizo; la hembra es parda moteada. El perfil de cabeza inclinada hacia el pesado pico lo identifica incluso a distancia y lo separa del pato de collar y otras cercetas.

Dónde y cuándo observarla

Espejo de agua abierto y somero de la laguna, donde nada filtrando, a menudo en grupos cerca de zonas con materia orgánica en suspensión (estimado). Presencia principal: Octubre a abril (estimado).



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Pato Tepalcate

Oxyura jamaicensis (Gmelin, 1789)



OTROS NOMBRES Pato rufo · Pato chaparro · Pato zambullidor



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

● ESTATUS Migratoria de invierno

● OCURRENCIA Poco común

● DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN LC NOM-059 —

TAXONOMÍA

ORDEN	Anseriformes
FAMILIA	Anatidae
GÉNERO	<i>Oxyura</i>

MEDIDAS

TAMAÑO

34-43
cm

PESO

310-795
g

ENVERGADURA

47-62
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Lagunas y humedales de agua dulce

⌚ Amanecer y atardecer

Descripción

Pequeño pato buceador (33-38 cm) que llama la atención por su cola rígida, a menudo levantada, y su inquietud en el agua. En celo, el macho luce cuerpo castaño rojizo, cabeza negra y un vistoso pico azul; la hembra es parda con líneas oscuras en el rostro. Pasa el tiempo sumergido buscando insectos acuáticos, crustáceos y plantas.

¿Sabías que?

El macho exhibe un vistoso pico azul brillante durante el cortejo y realiza un despliegue golpeando el pecho con el pico para producir burbujas en el agua.

Cómo identificarla

Pato pequeño y rechoncho de cola rígida que a menudo lleva levantada. El macho reproductor tiene cuerpo castaño rojizo intenso, píleo negro, mejillas blancas y un llamativo pico azul celeste. La hembra y el macho en plumaje básico son pardo grisáceos con franja oscura cruzando la mejilla. La cola erecta y la mejilla pálida lo hacen inconfundible.

Dónde y cuándo observarla

Buscarlo nadando en aguas someras junto a tulares y vegetación emergente de la laguna, donde se zambulle con frecuencia (estimado). Presencia principal: Octubre a abril (estimado).



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org




Pijije Alas Blancas

Dendrocygna autumnalis (Linnaeus, 1758)



OTROS NOMBRES Pijije ala blanca · Pichichi · Pato silbón vientre negro



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

ESTATUS Residente

OCURRENCIA Común

DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Anseriformes

FAMILIA

Anatidae

GÉNERO

Dendrocygna

MEDIDAS

TAMAÑO

47–56
cm

PESO

652–1020
g

ENVERGADURA

76–94
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Lagunas, esteros y zonas inundables

⌚ Amanecer y atardecer

Descripción

Pato de talla media (45-53 cm), de silueta esbelta y patas largas. Llama la atención su colorido: cabeza y cuello grises con anillo blanco en el ojo, cuerpo castaño, alas negras, pico rojo encendido y patas rosadas. Es básicamente herbívoro, aunque a veces toma invertebrados. Muy sociable, puebla humedales y terrenos inundados en nutridas bandadas.

¿Sabías que?

A diferencia de la mayoría de los patos, anida en cavidades de árboles y emite silbidos agudos característicos, hábito que le da el nombre en inglés de 'whistling-duck'.

Cómo identificarla

Inconfundible: cuerpo café canela con vientre negro, pico rosa rojizo intenso y patas igualmente rosadas, además de un gran parche alar blanco muy visible en vuelo que origina su nombre. Cuello largo y postura erguida, con cara grisácea y anillo ocular claro. Ambos sexos son similares, lo que facilita su identificación frente a otros patos.

Dónde y cuándo observarla

Buscarlo posado o nadando en las orillas de la laguna y tulares, así como percha en árboles circundantes, especialmente al atardecer (estimado). Presente todo el año.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Zambullidor Menor

Tachybaptus dominicus (Linnaeus, 1766)



OTROS NOMBRES Zambullidor chico · Zampullín enano · Macá gris



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

ESTATUS Residente

OCURRENCIA Común

DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

Pr

TAXONOMÍA

ORDEN

Podicipediformes

FAMILIA

Podicipedidae

GÉNERO

Tachybaptus

MEDIDAS

TAMAÑO

21–27
cm

PESO

112–180
g

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Lagunas y estanques con vegetación

Amanecer y atardecer

Descripción

Diminuta ave acuática de 15 a 25 cm, de cuerpo rechoncho y cuello corto que le da un aire compacto. El dorso es pardo oscuro y el pecho y vientre, más claros; en celo el macho desarrolla un negro brillante en la cabeza. Se sumerge para conseguir insectos acuáticos, crustáceos y vegetación. Se han registrado grupos de hasta veinte individuos.

¿Sabías que?

Está catalogado como especie sujeta a protección especial (Pr) en la NOM-059-SEMARNAT-2010, pese a estar clasificado como de Preocupación Menor por la UICN; es el zambullidor más pequeño del continente americano.

Cómo identificarla

Zambullidor diminuto y pardo con pico fino y puntiagudo y un característico ojo de iris amarillo o anaranjado brillante. Se distingue del Zambullidor Pico Grueso por su menor tamaño, pico delgado y ojo claro. Ambos sexos son similares.

Dónde y cuándo observarla

Aguas someras junto al tular y la vegetación riparia densa, donde bucea de forma discreta y permanece cerca de la cobertura (estimado). Presente todo el año.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org




Zambullidor Pico Grueso

Podilymbus podiceps (Linnaeus, 1758)



OTROS NOMBRES Zambullidor piquipinto · Macá pico grueso · Zampullín picogrueso



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

● **ESTATUS** Residente

● **OCURRENCIA** Poco común

● **DISTRIBUCIÓN** Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Podicipediformes

FAMILIA

Podicipedidae

GÉNERO

Podilymbus

MEDIDAS

TAMAÑO

31-38
cm

PESO

253-568
g

ENVERGADURA

45-62
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Lagunas y estanques de agua dulce

⌚ Amanecer y atardecer

Descripción

Pequeña ave acuática de 30 a 38 cm, de cuerpo compacto, cuello corto y cabeza redondeada. En la temporada reproductiva el macho viste tonos oscuros con un distintivo collar blanco, mientras la hembra es más apagada, en pardos y grises. Se alimenta de peces, insectos acuáticos y crustáceos. Nada y bucea con destreza, varios segundos bajo el agua.

¿Sabías que?

En lugar de volar, ante una amenaza suele hundirse lentamente en el agua hasta dejar solo la cabeza a la vista, comportamiento que le ha valido apodos como 'pato de agua' o 'buzo'.

Cómo identificarla

Zambullidor compacto, pardo, con pico corto, grueso y pálido; en plumaje reproductor muestra un anillo negro vertical en el pico y mancha negra en la garganta. Se distingue del Zambullidor Menor por su mayor tamaño, pico más grueso y ojo oscuro. Ambos sexos son similares.

Dónde y cuándo observarla

Aguas abiertas pero cercanas al tular, donde bucea con frecuencia y se oculta entre la vegetación emergente ante el peligro (estimado). Presente todo el año.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Agachadiza de Wilson

Gallinago delicata (Ord, 1825)



OTROS NOMBRES Becasina de Wilson · Agachadiza Común de Wilson



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

● ESTATUS Migratoria de invierno

● OCURRENCIA Poco común

● DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Charadriiformes

FAMILIA

Scolopacidae

GÉNERO

Gallinago

MEDIDAS

TAMAÑO

23–28
cm

PESO

79–147
g

ENVERGADURA

39–45
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Marismas, ciénagas y pastizales húmedos

⌚ Amanecer y atardecer

Descripción

Ave playera mediana de 25 a 28 cm, de cuerpo rechoncho y pico extraordinariamente largo y recto. Su plumaje es un mosaico críptico de pardos, negros y ocre, con líneas claras en dorso y cabeza que la camuflan sobre el fango. Vientre claro, flancos barrados y patas verdosas. Se levanta de forma explosiva, con vuelo zigzagante, y sondea el lodo.

¿Sabías que?

Durante el cortejo, el macho realiza un vuelo acrobático en el que el aire que pasa por las plumas externas de la cola produce un peculiar sonido vibrante conocido como 'tamborileo' o 'winnowing'.

Cómo identificarla

El pico desproporcionadamente largo y recto junto con el patrón rayado de la cabeza y el dorso son las claves principales. Al ser flushada, vuela en zigzag y emite una nota áspera, mostrando un patrón alar oscuro. Las líneas dorsales pálidas y los flancos barrados ayudan a separarla de otras playeras.

Dónde y cuándo observarla

Buscarla en las orillas fangosas y zonas encharcadas al pie del tular y la vegetación riparia de la laguna (estimado). Presencia principal: Principalmente de septiembre a abril, con mayor presencia entre octubre y marzo.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimo.org



Candelerero Americano

Himantopus mexicanus (Müller, 1776)



OTROS NOMBRES Cigüeñuela americana · Monjita americana · Cigüeñuela de cuello negro



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

● **ESTATUS** Residente

● **OCURRENCIA** Poco común

● **DISTRIBUCIÓN** Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Charadriiformes

FAMILIA

Recurvirostridae

GÉNERO

Himantopus

MEDIDAS

TAMAÑO

35–39
cm

PESO

150–176
g

ENVERGADURA

71.5–75.5
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Lagunas y humedales someros

⌚ Amanecer y atardecer

Descripción

Ave playera estilizada y elegante, de 35 a 39 cm, inconfundible por sus larguísimas patas rosadas a rojo intenso. El plumaje es contrastado: blanco por debajo y negro brillante en dorso, alas y nuca, con pico recto, fino y negro. Camina pausada por aguas someras y orillas fangosas. Es bulliciosa y territorial cerca de su área.

¿Sabías que?

Cuando un depredador se acerca a su nido, los adultos realizan vistosas exhibiciones de distracción y vuelos de alarma muy ruidosos para alejar la amenaza, comportamiento típico de las aves que anidan en el suelo.

Cómo identificarla

Clave de campo: patas larguísimas rosa-rojas, plumaje blanco y negro contrastado y pico recto y fino; es prácticamente inconfundible. El macho tiene el dorso negro intenso y la hembra tiende a un dorso más pardusco. Se distingue de otras playeras por su gran tamaño relativo, su postura erguida y sus patas exageradamente largas.

Dónde y cuándo observarla

Búsquela vadeando en aguas someras y caminando por las orillas fangosas del cuerpo principal de la laguna (estimado). Presente todo el año.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Chorlo Tildío

Charadrius vociferus Linnaeus, 1758



OTROS NOMBRES Chorlitejo Culirrojo · Chorlo Gritón · Chorlitejo Colirrojo



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

ESTATUS Residente

OCURRENCIA Poco común

DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Charadriiformes

FAMILIA

Charadriidae

GÉNERO

Charadrius

MEDIDAS

TAMAÑO

20–28
cm

PESO

72–121
g

ENVERGADURA

59–63
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Pastizales, campos abiertos y orillas

⌚ Primeras horas de la mañana

Descripción

Chorlo de pastizales, humedales y campos abiertos de Norteamérica. Mide 23-27 cm; es pardo por encima y blanco por debajo, con dos bandas negras en el pecho. Destaca su táctica antidepredadores: simula tener un ala rota y se aleja cojeando para apartar al intruso de sus crías. Come insectos, gusanos y otros pequeños invertebrados.

¿Sabías que?

Es célebre por su despliegue de 'ala rota', con el que finge estar herido arrastrando un ala para alejar a los depredadores del nido; su nombre en inglés, 'Killdeer', imita su sonoro reclamo.

Cómo identificarla

Chorlo de tamaño mediano, pardo por encima y blanco por debajo, inconfundible por sus dos bandas pectorales negras completas. Muestra rabadilla y base de la cola anaranjada visible al vuelo y un anillo ocular rojizo. Su gran tamaño y la doble banda lo separan de otros chorlos menores de una sola banda; ambos sexos son similares.

Dónde y cuándo observarla

Orillas fangosas, playones descubiertos y zonas abiertas de pasto corto alrededor de la laguna, donde corre y se detiene al forrajear (estimado). Presente todo el año.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Playero Alzacolita

Actitis macularius (Linnaeus, 1766)



OTROS NOMBRES Playero Manchado · Andarríos Maculado · Andarríos Coleador



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

● **ESTATUS** Migratoria de invierno

● **OCURRENCIA** Poco común

● **DISTRIBUCIÓN** Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Charadriiformes

FAMILIA

Scolopacidae

GÉNERO

Actitis

MEDIDAS

TAMAÑO

18–20
cm

PESO

34–50
g

ENVERGADURA

37–40
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Orillas de ríos, lagos y costas

🕒 Primeras horas de la mañana

Descripción

Pequeño playero estilizado (18-20 cm) con dos libreas: la reproductiva, con motas en el pecho —rara aquí—, y la invernala, más frecuente, de pecho blanco sin marcas. Balancea la cola de arriba abajo, hábito que le da nombre. Tiene pico fino y algo curvo. Frecuenta orillas de agua dulce, donde come insectos, crustáceos e invertebrados.

¿Sabías que?

Su balanceo incesante del cuerpo es tan distintivo que permite identificarlo a distancia incluso antes de apreciar detalles del plumaje; puede nadar y bucear brevemente para escapar de depredadores.

Cómo identificarla

Playero pequeño y compacto que balancea constantemente la cola y la parte trasera del cuerpo. En plumaje reproductivo luce vientre blanco con manchas negras redondeadas y pico anaranjado de punta oscura; en el no reproductivo (el habitual aquí) pierde las manchas y muestra una cuña blanca entre hombro y pecho. Su vuelo bajo y rígido es distintivo.

Dónde y cuándo observarla

Orillas fangosas y márgenes pedregosas de la laguna y de los arroyos afluentes, donde camina solitario balanceándose junto al borde del agua (estimado). Presencia principal: Agosto a mayo, con mayor probabilidad de octubre a abril (estimado).



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimojo.org





Golondrina Alas Aserradas

Stelgidopteryx serripennis (Audubon, 1838)

OTROS NOMBRES Golondrina Aserrada · Golondrina Alirrasposa Norteña · Golondrina Ala Aserrada



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

ESTATUS Residente

OCURRENCIA Común

DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Passeriformes

FAMILIA

Hirundinidae

GÉNERO

Stelgidopteryx

MEDIDAS

TAMAÑO

13-15
cm

PESO

10-18
g

ENVERGADURA

27-30
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Riberas, barrancos y zonas abiertas

Mañana y tarde

Descripción

Pequeña golondrina migratoria de Norteamérica y Centroamérica, casi siempre cerca de ríos, lagunas y humedales. Parda por arriba y más pálida por debajo, con alas largas y puntiagudas de bordes aserrados que le dan nombre. Mide 12-15 cm y vuela con agilidad cazando insectos. Anida en cavidades de taludes y barrancos, donde excava túneles.

¿Sabías que?

Su nombre alude a las pequeñas barbas en forma de gancho del borde externo de las plumas primarias, perceptibles solo de cerca; a diferencia de muchas golondrinas, no forma colonias densas y suele anidar de forma dispersa.

Cómo identificarla

Golondrina de tonos pardos apagados, con dorso café-grisáceo, garganta y pecho café claro difuso que se aclara hacia el vientre blanquecino, sin contraste marcado. Se diferencia de la Golondrina Ribereña (*Riparia riparia*) por carecer de banda pectoral oscura definida y por su garganta parda en lugar de blanca. Su vuelo es lento y poco acrobático.

Dónde y cuándo observarla

Volando bajo sobre la laguna y los arroyos, cerca de taludes y orillas erosionadas donde puede anidar en huecos y madrigueras (estimado). Presente todo el año.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA

en línea · fauna.chirimoyo.org



Golondrina Tijereta

Hirundo rustica Linnaeus, 1758



OTROS NOMBRES Golondrina Común · Golondrina Ranchera



(c) Adrianh M. Orozco, some rights reserved (CC BY)

CC BY 4.0

ESTADO

● **ESTATUS** Migratoria de verano

● **OCURRENCIA** Común

● **DISTRIBUCIÓN** Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Passeriformes

FAMILIA

Hirundinidae

GÉNERO

Hirundo

MEDIDAS

TAMAÑO

17–19
cm

PESO

16–22
g

ENVERGADURA

32–34.5
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Campos abiertos y áreas habitadas

⌚ Mañana y tarde

Descripción

Golondrina migratoria pequeña (12-16 cm) de plumaje distintivo: dorso azul reluciente, vientre blanco, pecho anaranjado y largas plumas caudales ahorquilladas que le dan elegancia en vuelo. Recorre enormes distancias y caza insectos al vuelo con vertiginosas acrobacias. Muy sociable, suele asociarse con la llegada de la primavera.

¿Sabías que?

Es muy tolerante a la presencia humana y casi siempre anida en estructuras construidas por el hombre; sus largas plumas externas de la cola son objeto de selección sexual, prefiriendo las hembras a machos con colas más largas y simétricas.

Cómo identificarla

Golondrina esbelta con cola profundamente ahorquillada y "streamers" o plumas externas muy alargadas, rasgo único en la región. Dorso azul acero brillante, frente y garganta castaño-rojizas y vientre canela o ante. Se distingue de otras golondrinas por su cola tijereta y su garganta rufa; los juveniles tienen la cola menos profunda.

Dónde y cuándo observarla

Volando bajo sobre el espejo de agua de la laguna y los pastizales adyacentes, a menudo posada en cables y cercas cercanas a la orilla (estimado). Presencia principal: Marzo a octubre, con paso migratorio abundante; algunos individuos pueden verse casi todo el año (estimado).



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Luis Bienteveo

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766)



OTROS NOMBRES Bienteveo Común · Luis Grande · Cristofué · Bichofué · Güis Común



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

ESTATUS Residente

OCURRENCIA Común

DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Passeriformes

FAMILIA

Tyrannidae

GÉNERO

Pitangus

MEDIDAS

TAMAÑO

25–28
cm

PESO

53–72
g

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Zonas abiertas, jardines y orillas de agua

⌚ Primeras horas de la mañana

Descripción

Ave muy frecuente en Latinoamérica, identificable por su colorido y su canto, que parece decir 'bien te veo!'. Mide 22-25 cm: cuerpo pardo, vientre amarillo, cabeza negra con franja blanca sobre los ojos y corona amarilla. Frente a especies parecidas se reconoce por el tono rojizo de las alas. De dieta amplia y carácter bullicioso y territorial.

¿Sabías que?

Su llamado fuerte y enfático "bien-te-veo" da origen a su nombre común en español; es uno de los pocos passeriformes capaces de pescar zambulléndose en el agua como un martín pescador.

Cómo identificarla

Tiránido grande y robusto, inconfundible por su vientre amarillo brillante, dorso pardo-oliváceo, garganta blanca y antifaz negro con cejas blancas que se unen en la nuca. Posee una corona oculta amarillo-anaranjada que rara vez muestra. Se distingue de tiránidos similares por su mayor tamaño, pico más grueso y largo, y tonos rufos en alas y cola.

Dónde y cuándo observarla

Perchas expuestas en arbustos, postes y árboles de la vegetación riparia junto a la orilla, desde donde vigila el agua y la vegetación para cazar (estimado). Presente todo el año.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Martín Pescador Norteño

Megaceryle alcyon (Linnaeus, 1758)



OTROS NOMBRES Martín Pescador de Collar Norteño · Martín-pescador Norteño



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

● ESTATUS Migratoria de invierno

● OCURRENCIA Rara

● DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Coraciiformes

FAMILIA

Alcedinidae

GÉNERO

Megaceryle

MEDIDAS

TAMAÑO

28–35
cm

PESO

113–178
g

ENVERGADURA

48–58
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Ríos, lagos y costas con peces

🕒 Primeras horas de la mañana

Descripción

Ave ribereña diestra en la pesca (28-35 cm). Viste azul grisáceo por arriba, collar blanco y vientre blanco o rojizo. Vigila desde una rama junto al agua y, al ver un pez, se zambulle en picada para atraparlo con su fuerte pico; también come insectos y anfibios. Solitario y territorial, su presencia subraya la riqueza del humedal.

¿Sabías que?

Es de las pocas especies de aves de Norteamérica donde la hembra luce más colorida que el macho; suele delatar su presencia con su llamado de traqueteo metálico antes de ser visto.

Cómo identificarla

Ave robusta de cabeza grande con cresta hirsuta y pico largo y fuerte. Dorso y banda pectoral azul-gris pizarra sobre vientre blanco; presenta marcado dimorfismo sexual: la hembra suma una segunda banda ventral castaño-rufa, ausente en el macho. Su vuelo directo sobre el agua, con un sonajeo o traqueteo seco y fuerte, facilita su detección.

Dónde y cuándo observarla

Perchas expuestas (ramas secas, postes o cables) sobre las orillas de la laguna y los arroyos, desde donde vigila el agua antes de zambullirse (estimado). Presencia principal: Septiembre a abril (estimado).



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org





Mosquero Cardenal

Pyrocephalus rubinus (Boddaert, 1783)

OTROS NOMBRES Mosquero Bermellón · Cardenalito · Churrinche · Papamoscas cardenalito · Atrapamoscas sangretoro



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

● **ESTATUS** Residente

● **OCURRENCIA** Común

● **DISTRIBUCIÓN** Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Passeriformes

FAMILIA

Tyrannidae

GÉNERO

Pyrocephalus

MEDIDAS

TAMAÑO

13–14
cm

PESO

11–14
g

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Áreas abiertas, riberas y pastizales

🕒 Primeras horas de la mañana

Descripción

Pequeño mosquero de 13 a 14 cm. El macho es inconfundible por su copete y partes inferiores rojo bermellón, con antifaz, dorso, alas y cola oscuros. La hembra es gris parduzca, con pecho estriado y lavado rosado en el vientre. Caza desde perchas expuestas con vuelos cortos. En el humedal frecuenta alambradas y arbustos de las orillas.

¿Sabías que?

Algunos autores separan a las poblaciones de Norte y Centroamérica como *Pyrocephalus obscurus/mexicanus*; bajo el criterio aquí solicitado se mantiene como *Pyrocephalus rubinus*. El macho realiza vistosos vuelos nupciales ascendentes cantando para atraer a la hembra.

Cómo identificarla

El macho es inconfundible por su rojo bermellón intenso con antifaz y dorso oscuros. La hembra, gris con pecho estriado y vientre teñido de rosado o salmón, requiere más atención. La conducta de cazar desde perchas expuestas con vuelos cortos y vibrantes es una clave útil.

Dónde y cuándo observarla

Perchas expuestas (alambradas, ramas secas, arbustos) en zonas abiertas, orillas y bordes de cultivo alrededor de la laguna (estimado). Presente todo el año.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Tirano Tropical

Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819

OTROS NOMBRES Tirano pirirí · Sirirí común · Benteveo real



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

ESTATUS Residente

OCURRENCIA Común

DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Passeriformes

FAMILIA

Tyrannidae

GÉNERO

Tyrannus

MEDIDAS

TAMAÑO

18–23
cm

PESO

32–43
g

ENVERGADURA

38–41
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Áreas abiertas con árboles dispersos

⌚ Primeras horas de la mañana

Descripción

Papamoscas tirano robusto de 18 a 22 cm, de postura erguida y aspecto vigoroso. Cabeza gris, tenue máscara oscura, pecho grisáceo y vientre amarillo intenso, con dorso oliváceo y cola pardo oscura ligeramente ahorquillada. Conspicuo, se posa en cables, postes y ramas altas para capturar insectos. Territorial, persigue aves mucho mayores que él.

¿Sabías que?

Es notablemente agresivo y territorial: no duda en hostigar y perseguir en vuelo a rapaces y otras aves grandes que invaden su área, emitiendo trinos agudos y vibrantes muy característicos al amanecer.

Cómo identificarla

Clave de campo: vientre amarillo intenso, pecho y cabeza grises, dorso oliváceo y cola pardo oscura sin bordes blancos. Es muy similar a otros tiranos de vientre amarillo; la combinación de cola ahorquillada parda y pico relativamente grueso ayuda a separarlo del Tirano Pálido y el Tirano de Couch, este último mejor distinguido por la voz.

Dónde y cuándo observarla

Búsquelo posado en perchas expuestas como cables, postes y ramas altas en las orillas arboladas y zonas abiertas del humedal (estimado). Presente todo el año.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org





Vencejo de Vaux

Chaetura vauxi (Townsend, 1839)

OTROS NOMBRES Vencejo Común · Vencejo Lomimarrón · Vencejo Grisáceo



(c) Gonzalo Zepeda Martínez, some rights reserved (CC BY-SA)

CC BY-SA
4.0

ESTADO

● ESTATUS Migratoria de invierno

● OCURRENCIA Poco común

● DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Caprimulgiformes

FAMILIA

Apodidae

GÉNERO

Chaetura

MEDIDAS

TAMAÑO

10–12
cm

PESO

11–18
g

ENVERGADURA

28–31
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Bosques y zonas urbanas con chimeneas

⌚ Mañana y tarde

Descripción

Diminuto vencejo migratorio (11-12 cm), de cuerpo afilado y aerodinámico, gris oscuro por arriba y más claro en el vientre. Pasa casi toda su vida volando: come, descansa y se traslada en pleno vuelo, con desplazamiento veloz y errático que le permite cazar insectos al aire. Anida en chimeneas, troncos huecos y oquedades de árboles.

¿Sabías que?

Es uno de los vencejos más pequeños de América del Norte; durante la migración miles de individuos pueden congregarse para pernoctar en chimeneas grandes, formando espectaculares remolinos al anochecer.

Cómo identificarla

Vencejo pequeño, de cuerpo achaparrado y alas cortas y ahusadas, con cola muy corta y aspecto de "cigarro volador". Plumaje café-grisáceo apagado, algo más pálido en garganta y rabadilla. Se distingue por su menor tamaño, vuelo tembloroso y aleteo rápido alternado con planeos cortos; carece de marcas blancas alares o cola ahorquillada.

Dónde y cuándo observarla

Sobre el espejo de agua de la laguna y el cielo abierto circundante, donde caza insectos en vuelo alto, frecuentemente en bandadas al amanecer y atardecer (estimado). Presencia principal: Posible todo el año por poblaciones residentes; los migrantes norteros son más probables de octubre a abril (estimado).



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Aguililla Caminera

Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788)



OTROS NOMBRES Busardo Caminero · Gavilán Caminero · Gavilán Pollero · Gavilán Chapulinero



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

ESTATUS Residente

OCURRENCIA Común

DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Accipitriformes

FAMILIA

Accipitridae

GÉNERO

Rupornis

MEDIDAS

TAMAÑO

33–41
cm

PESO

250–300
g

ENVERGADURA

68–79
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Bordes de bosque y zonas semiabiertas

Media mañana

Descripción

Rapaz de tamaño intermedio, también llamada gavilán caminero, de terrenos despejados y linderos selváticos de México a Argentina. Mide 31-41 cm, con envergadura de 79 cm. Manto pardo y grisáceo, cola con franjas oscuras, pecho y vientre claros finamente rayados. Caza roedores, reptiles, aves e insectos. Suele verse quieta sobre un poste o a pie.

¿Sabías que?

Es la rapaz diurna más frecuentemente vista a lo largo de caminos y bordes de cultivo en el trópico mexicano, de ahí su nombre; su llamado agudo y nasal es muy característico y delata su presencia.

Cómo identificarla

Rapaz mediana de aspecto compacto, con cabeza y pecho gris pardusco, vientre finamente barrado de café y blanco, e iris pálido (amarillento). En vuelo muestra parches rufos llamativos en las primarias y una cola con bandas claras y oscuras. Su tamaño moderado, ojo claro y voz aguda la distinguen de otras aguilillas; los juveniles son más estriados.

Dónde y cuándo observarla

Perchas en árboles y postes del borde arbolado que rodea la laguna, desde donde vigila claros y orillas en busca de presas (estimado). Presente todo el año.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org





Halcón Murcielaguero

Falco rufigularis Daudin, 1800

OTROS NOMBRES Halcón negro chico · Halcón plumizo menor · Halcón golondrina · Halcón enano



(c) Adrianh M. Orozco, some rights reserved (CC BY)

CC BY 4.0

ESTADO

● ESTATUS Residente

● OCURRENCIA Rara

● DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Falconiformes

FAMILIA

Falconidae

GÉNERO

Falco

MEDIDAS

TAMAÑO

23–30
cm

PESO

108–242
g

ENVERGADURA

51–67
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Bordes de selva tropical y claros

⌚ Amanecer y atardecer

Descripción

Rapaz veloz y ágil de selvas tropicales y zonas abiertas de Latinoamérica. Mide de 30 a 35 cm, con envergadura de hasta 70 cm. Dorso negro, pecho y vientre barrados, capuchón negro sobre garganta blanca y 'pantalones' rojizos. Especializada en cazar murciélagos al vuelo en el alba y el ocaso; también toma insectos y aves. En el Chirimoyo es rara.

¿Sabías que?

Su nombre alude a su hábito de capturar murciélagos en vuelo durante el crepúsculo, momento en que es más activo y detectable.

Cómo identificarla

Halcón pequeño y compacto (22-29 cm) de dorso negruzco, con garganta y pecho superior blanco a anteado, vientre y muslos rufos contrastantes y bandeo oscuro en el abdomen. Alas largas y puntiagudas, típicas de los Falco. La combinación de garganta clara y calzón rufo lo distingue del similar Halcón Enano (*Falco albigularis*).

Dónde y cuándo observarla

Buscarlo posado en lo alto de árboles muertos o emergentes en los bordes de la laguna y vegetación riparia, especialmente al amanecer y atardecer cuando caza (estimado). Presente todo el año.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org





Zopilote Aura

Cathartes aura (Linnaeus, 1758)

OTROS NOMBRES Aura Gallipavo · Aura Común · Aura Tiñosa · Zopilote Cabecirrojo · Jote de Cabeza Colorada



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

● **ESTATUS** Residente

● **OCURRENCIA** Poco común

● **DISTRIBUCIÓN** Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Cathartiformes

FAMILIA

Cathartidae

GÉNERO

Cathartes

MEDIDAS

TAMAÑO

64–81
cm

PESO

800–2410
g

ENVERGADURA

160–183
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Áreas abiertas, bosques y carroñeo amplio

⌚ Media mañana

Descripción

Carroñero de gran envergadura (1,5-2 m) y cuerpo de 60-81 cm, de plumaje negro dominante. La cabeza y el cuello, desnudos, son rojo encendido en adultos y negruzcos en jóvenes; esa piel desnuda facilita su aseo tras comer. Su agudo olfato rastrea restos en descomposición a kilómetros y, al acelerarla, ayuda al reciclaje de nutrientes.

¿Sabías que?

Es una de las pocas aves con sentido del olfato altamente desarrollado, capaz de detectar el etilmercaptano liberado por la materia en descomposición; suele extender las alas al sol por la mañana para termorregularse y eliminar parásitos.

Cómo identificarla

Gran carroñera de plumaje pardo-negruzco y cabeza pequeña, desnuda y roja en adultos (grisácea en jóvenes). En vuelo mantiene las alas en "V" poco profunda (diedro) y planea tambaleante, con las plumas de vuelo más claras formando contraste bicolor visto desde abajo. Se distingue del Zopilote Común por su cola más larga y vuelo más bamboleante.

Dónde y cuándo observarla

Planeando en círculos sobre el cielo abierto de la laguna y zonas circundantes, o posado en árboles altos y estructuras expuestas al amanecer (estimado). Presente todo el año.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Zopilote Común

Coragyps atratus (Bechstein, 1793)



OTROS NOMBRES Zopilote Negro · Gallinazo · Chulo · Zamuro · Jote de Cabeza Negra



(c) Víctor De la Cruz, some rights reserved (CC BY)

CC BY 4.0

ESTADO

ESTATUS Residente

OCURRENCIA Común

DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Cathartiformes

FAMILIA

Cathartidae

GÉNERO

Coragyps

MEDIDAS

TAMAÑO

56–74
cm

PESO

1180–3000
g

ENVERGADURA

133–167
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Zonas abiertas, urbanas y basureros

Media mañana

Descripción

Buitre americano de buen tamaño (60-81 cm, hasta 1,5 m de envergadura). Su plumaje es negro mate, con sutil brillo azulado al sol, y la cabeza, calva y grisácea, facilita su higiene al comer carroña. Detecta restos en descomposición desde lejos por su fino olfato. Es clave en el ecosistema: retira materia orgánica y frena enfermedades.

¿Sabías que?

Su estómago produce ácidos extremadamente corrosivos que le permiten consumir carroña en descomposición portadora de patógenos como ántrax o botulismo sin enfermar.

Cómo identificarla

Ave grande y completamente negra, con cabeza desnuda gris oscura y patas relativamente cortas. En vuelo muestra alas anchas y cortas con parches blanquecinos conspicuos en las puntas (bajo las primarias) y cola corta y cuadrada, con aleteos rápidos seguidos de planeos breves. Se distingue del Zopilote Aura por su cola corta y su vuelo inestable.

Dónde y cuándo observarla

Suele observarse planeando en cielo abierto sobre la laguna y zonas circundantes, o posado en árboles altos y estructuras urbanas perimetrales (estimado). Presente todo el año.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Carpintero Cheje

Melanerpes aurifrons (Wagler, 1829)



OTROS NOMBRES Carpintero frente dorada · Carpintero común · Cheje



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

ESTATUS Residente

OCURRENCIA Común

DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Piciformes

FAMILIA

Picidae

GÉNERO

Melanerpes

MEDIDAS

TAMAÑO

22–26
cm

PESO

65–102
g

ENVERGADURA

41–43
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Bosques secos y matorrales

⌚ Primeras horas de la mañana

Descripción

Pícido mediano, de 22 a 26 cm, con dorso finamente barrado en blanco y negro que recuerda a un código de barras y nuca dorada o anaranjada; el macho añade un parche rojo en la coronilla. Activo y vocal, se desplaza a saltos por troncos y ramas. En el Chirimoyo frecuente el arbolado de las orillas y las cercas vivas.

¿Sabías que?

Su tamborileo rítmico sobre troncos secos sirve tanto para forrajear como para comunicarse y delimitar territorio, y es uno de los carpinteros más adaptables a ambientes urbanos.

Cómo identificarla

Clave de campo: dorso barrado en blanco y negro, nuca dorada o anaranjada y nota amarilla en la frente. El macho tiene parche rojo en la coronilla que la hembra no presenta. Se diferencia de otros *Melanerpes* por la combinación de nuca dorada y vientre uniforme sin grandes parches de color.

Dónde y cuándo observarla

Búsqueda trepando por troncos y ramas del arbolado de las orillas y de las cercas vivas en el borde urbano del humedal (estimado). Presente todo el año.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org




Chara Pea

Cyanocorax morio (Wagler, 1829)



OTROS NOMBRES Chara papán · Urraca parda · Piapia · Papán oscuro



(c) Kevin Brix, some rights reserved (CC BY-SA)

CC BY-SA 4.0

ESTADO

ESTATUS Residente

OCURRENCIA Poco común

DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Passeriformes

FAMILIA

Corvidae

GÉNERO

Cyanocorax

MEDIDAS

TAMAÑO

38–44
cm

PESO

173–224
g

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Bosques, bordes y matorrales tropicales

⌚ Primeras horas de la mañana

Descripción

Córido de talla media, de 33 a 38 cm. Cabeza, cuello y parte alta del pecho negros contrastan con el cuerpo pardo oscuro y el vientre más claro. Su pico y patas robustos sirven a una dieta omnívora de frutos, insectos y pequeños vertebrados. Sociable e inteligente, va en grupos bulliciosos. En el Chirimoyo habita márgenes del humedal y arboledas.

¿Sabías que?

Es una de las charas más sociales de América; los juveniles conservan el pico amarillo y placas faciales antes de adquirir el pico negro del adulto. Antes se ubicaba en el género *Psilorhinus*, hoy incluido en *Cyanocorax*.

Cómo identificarla

Chara grande, esbelta y de cola larga, de coloración general café oscuro a pardo grisáceo, con vientre y porción terminal de la cola más claros (blanquecinos). El pico es negro en adultos y amarillo en juveniles. Su gran tamaño, comportamiento gregario ruidoso y ausencia de azul la distinguen de las charas azules.

Dónde y cuándo observarla

Buscarla en grupos vocales recorriendo los árboles y arbustos del borde del humedal y la vegetación riparia circundante (estimado). Presente todo el año.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Chipe Amarillo

Setophaga petechia (Linnaeus, 1766)



OTROS NOMBRES Reinita Amarilla · Reinita Dorada · Canario de mangle · Chipe Manglero



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

● ESTATUS Migratoria de invierno

● OCURRENCIA Común

● DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Passeriformes

FAMILIA

Parulidae

GÉNERO

Setophaga

MEDIDAS

TAMAÑO

12–13
cm

PESO

9–11
g

ENVERGADURA

16–20
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Matorrales ribereños y manglares

🕒 Primeras horas de la mañana

Descripción

Pequeño chipe de 11 a 13 cm, de coloración predominantemente amarilla que lo hace de los parúlidos más vistosos. El macho luce un amarillo intenso, con dorso verde oliva y finas estrías rojizas en pecho y flancos. La hembra es más apagada. Las poblaciones que invernán en Veracruz son del grupo norteño, sin capuchón castaño.

¿Sabías que?

Es uno de los hospederos más frecuentes del tordo parásito; cuando detecta un huevo ajeno en su nido, a veces construye un nuevo piso sobre la puesta para sepultarlo, llegando a formar nidos de varios niveles.

Cómo identificarla

El color amarillo uniforme y brillante, sin alas ni cola contrastantes oscuras, es la clave principal. Las estrías rojizas en el pecho del macho y los bordes amarillos en las plumas de la cola lo distinguen de otros chipes amarillentos. Carece de capuchón castaño en la cabeza, a diferencia de las formas residentes de manglar.

Dónde y cuándo observarla

Buscarlo en el arbolado, los arbustos húmedos y la vegetación riparia cercana a la orilla de la laguna (estimado). Presencia principal: Principalmente de septiembre a abril, con paso migratorio notable en otoño y primavera.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Chipe Charquero

Parkesia noveboracensis (Gmelin, 1789)



OTROS NOMBRES Reinita Acuática Norteña · Reinita Acuática · Chipe-suelero charquero · Cigüita de agua



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

● **ESTATUS** Migratoria de invierno

● **OCURRENCIA** Poco común

● **DISTRIBUCIÓN** Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Passeriformes

FAMILIA

Parulidae

GÉNERO

Parkesia

MEDIDAS

TAMAÑO

12–15
cm

PESO

13–25
g

ENVERGADURA

21–24
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Orillas de agua, pantanos y manglares

🕒 Primeras horas de la mañana

Descripción

Parúlido robusto y terrestre de 12 a 15 cm, más parecido a un tordito que a un chipe típico. Partes superiores pardo oliváceas uniformes e inferiores claras, amarillentas, densamente estriadas en pecho y flancos. Una ceja clara y angosta recorre el rostro. Su rasgo más característico es el balanceo constante del cuerpo y la cola al caminar.

¿Sabías que?

A pesar de pertenecer a la familia de los chipes, su silueta terrestre, sus hábitos de caminar por el fango y su constante balanceo le dan un aspecto y comportamiento más cercano al de un pequeño zorzal o playero.

Cómo identificarla

El balanceo continuo del cuerpo y la cola mientras camina por el suelo es la clave de comportamiento más útil. La ceja pálida y angosta, el dorso pardo uniforme y las partes inferiores fuertemente estriadas lo identifican. Suele detectarse primero por su fuerte nota metálica de llamado emitida desde las orillas.

Dónde y cuándo observarla

Buscarlo caminando sobre orillas fangosas, troncos y raíces bajo la vegetación riparia al borde de la laguna (estimado). Presencia principal: Principalmente de agosto a mayo, con paso migratorio marcado en otoño y primavera.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA

en línea · fauna.chirimoyo.org



Chipe Corona Negra

Cardellina pusilla (Wilson, 1811)



OTROS NOMBRES Chipe de Wilson · Reinita de Wilson · Reinita gorrinegra



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

● ESTATUS Migratoria de invierno

● OCURRENCIA Común

● DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Passeriformes

FAMILIA

Parulidae

GÉNERO

Cardellina

MEDIDAS

TAMAÑO

10–12
cm

PESO

5–10
g

ENVERGADURA

14–17
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Matorrales, bordes y vegetación riparia

🕒 Primeras horas de la mañana

Descripción

Passeriforme diminuto y llamativo que ronda los 10 a 12 cm. Lo identifica el píleo negro, que resalta frente al rostro amarillo encendido y el cuerpo verdoso. Con su pico delgado atrapa insectos, base de su alimentación. Migratorio, pasa la temporada fría en México y Centroamérica, el Chirimo entre ellos, revoloteando inquieto junto al agua.

¿Sabías que?

Veracruz es un corredor migratorio de relevancia mundial para passeriformes, y esta especie figura entre las migratorias más detectadas durante los pasos de otoño y primavera por la región.

Cómo identificarla

Chipe pequeño y vivaz de partes inferiores amarillo brillante, dorso verde oliva y rostro amarillo. El macho luce una conspicua corona o solideo negro lustroso que es la clave de identificación; la hembra puede mostrarlo reducido o ausente. Su tamaño diminuto, color amarillo intenso y constante movimiento de cola ayudan a separarlo de otros chipes.

Dónde y cuándo observarla

Buscarlo en el tular, arbustos densos y vegetación riparia de los bordes de la laguna, donde forrajea inquieto a baja y media altura (estimado). Presencia principal: Septiembre a abril (estimado).



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Chipe Trepador

Mniotilta varia (Linnaeus, 1766)



OTROS NOMBRES Chipe blanco y negro · Cebrita trepadora · Reinita trepadora · Chipe blanquinegro



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

● **ESTATUS** Migratoria de invierno

● **OCURRENCIA** Poco común

● **DISTRIBUCIÓN** Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN LC NOM-059 —

TAXONOMÍA

ORDEN Passeriformes
FAMILIA Parulidae
GÉNERO *Mniotilta*

MEDIDAS

TAMAÑO

11–13
cm

PESO

8–15
g

ENVERGADURA

18–22
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Bosques y troncos de árboles

🕒 Primeras horas de la mañana

Descripción

Chipe migratorio menudo, famoso por escalar cortezas y ramas como un trepatroncos, conducta poco usual entre sus parientes. Mide de 12 a 13 cm y pesa de 8 a 15 g. Lo cubre un diseño en blanco y negro, con listas que le dan apariencia rayada inconfundible. Rebusca insectos en la corteza. En invierno llega a humedales como el Chirimoyo.

¿Sabías que?

Es el único miembro de su género (*Mniotilta*), y su nombre significa literalmente 'el que arranca musgo', en alusión a su hábito de hurgar en la corteza. Es uno de los primeros chipes migratorios en aparecer en otoño.

Cómo identificarla

Pequeño chipe inconfundible con un patrón rayado en blanco y negro en toda la cabeza, dorso y partes inferiores, incluida la coronilla con raya central blanca. Su conducta de trepar sobre la corteza, junto con el pico relativamente largo y ligeramente curvado, lo distingue de otros chipes. El macho presenta garganta y mejillas más negras.

Dónde y cuándo observarla

Buscarlo trepando sobre troncos y ramas gruesas de los árboles que rodean la laguna y en la vegetación riparia arbórea (estimado). Presencia principal: Octubre a abril (estimado).



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Colibrí Berilo

Saucerottia beryllina (Lichtenstein, 1830)



OTROS NOMBRES Amazilia berilina · Colibrí colicastaña · Colibrí de berilo



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

ESTATUS Residente

OCURRENCIA Poco común

DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Caprimulgiformes

FAMILIA

Trochilidae

GÉNERO

Saucerottia

MEDIDAS

TAMAÑO

8-10
cm

PESO

4-5
g

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Bosques y bordes de montaña

⌚ Primeras horas de la mañana

Descripción

Colibrí pequeño y deslumbrante de zonas boscosas y semiabiertas desde México hasta Honduras. Su plumaje tornasolado refleja verdes esmeralda, azules y bronce según la luz. Mide de 8 a 10 cm y pesa apenas 4 a 5 g. Su pico fino y algo curvo liba néctar, que complementa con pequeños insectos. Territorial, defiende con agilidad sus flores.

¿Sabías que?

Aunque es residente, realiza desplazamientos altitudinales locales siguiendo la floración estacional; el reflejo rufo de sus alas es inconfundible cuando vuela a contraluz.

Cómo identificarla

Colibrí mediano (8-10 cm) con garganta y pecho verde brillante, dorso verde dorado a cobrizo y, sobre todo, alas y cola de tono castaño-rufo distintivo visibles en vuelo. El parche alar rufo es la clave principal de identificación en campo. Presenta dimorfismo sexual tenue, con hembras algo más opacas en el vientre.

Dónde y cuándo observarla

Buscarlo entre árboles y arbustos floridos del perímetro del humedal y la vegetación riparia, visitando flores o posado en ramas expuestas (estimado). Presente todo el año.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Gorrión Pantanero

Melospiza georgiana (Latham, 1790)

OTROS NOMBRES Chingolo pantanero



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

● ESTATUS Migratoria de invierno

● OCURRENCIA Rara

● DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Passeriformes

FAMILIA

Passerellidae

GÉNERO

Melospiza

MEDIDAS

TAMAÑO

12–15
cm

PESO

15–23
g

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Pantanos y humedales con vegetación densa

🕒 Primeras horas de la mañana

Descripción

Gorrión mediano de 12 a 15 cm, compacto y colorido. Partes superiores estriadas en rojizos, negros y ocre, con alas cálidas y rufas que contrastan con el pecho gris liso, el vientre claro y la garganta blanca. La cara es grisácea con línea ocular oscura, y muchos adultos muestran un capuchón rojizo en la corona. Discreto, se oculta en el tular.

¿Sabías que?

A diferencia de la mayoría de los gorriónes, está muy ligado al agua y muchas veces forrajea vadeando o caminando sobre fango y vegetación inundada en busca de invertebrados.

Cómo identificarla

El contraste entre el pecho gris liso sin estrías y las alas y dorso cálidos y rufos es la clave principal. El capuchón rojizo en la corona, presente sobre todo en plumaje reproductor, y la cara gris con línea ocular oscura ayudan a confirmarlo. Sus hábitos escondidos en vegetación densa de humedal lo distinguen de otros gorriónes más expuestos.

Dónde y cuándo observarla

Buscarlo entre el tular, los pastizales húmedos y la vegetación riparia densa al borde de la laguna (estimado). Presencia principal: Probable de octubre a abril, durante la temporada invernal.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea • fauna.chirimoyo.org



Mascarita Común

Geothlypis trichas (Linnaeus, 1766)



OTROS NOMBRES Mascarita nortea · Chipe de cara negra · Reinita gorgigualda



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

ESTATUS Residente

OCURRENCIA Común

DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Passeriformes

FAMILIA

Parulidae

GÉNERO

Geothlypis

MEDIDAS

TAMAÑO

11–13
cm

PESO

9–11
g

ENVERGADURA

15–19
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Humedales y vegetación densa

⌚ Primeras horas de la mañana

Descripción

Pequeña reinita de 11 a 13 cm, compacta y con la cola a menudo levantada. El macho luce un antifaz negro distintivo sobre frente, ojos y mejillas, con garganta y pecho amarillo intenso; la hembra carece del antifaz y es más olivácea, mostrando marcado dimorfismo. Esquiva, se mueve en vegetación densa baja cerca del agua, en el tular y las orillas.

¿Sabías que?

Su canto característico, una frase repetida y rítmica que suele transcribirse como 'güichití-güichití-güichití', es una de las mejores formas de detectarla, ya que permanece oculta entre la vegetación densa.

Cómo identificarla

Clave de campo: el macho con antifaz negro y garganta amarilla es inconfundible. La hembra, sin antifaz, se reconoce por el tono oliváceo del dorso, el amarillo de la garganta y subcaudales, y su comportamiento furtivo en vegetación baja húmeda. Su hábito de moverse cerca del agua con la cola levantada ayuda a separarla de otras reinitas.

Dónde y cuándo observarla

Búsquela entre el tular, los juncos y los matorrales húmedos al borde del agua, donde se mueve cerca del suelo (estimado).
Presente todo el año.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org





Mirlo Pardo

Turdus grayi Bonaparte, 1838

OTROS NOMBRES Zorzal Pardo · Mirla Parda · Mirlo Café · Mirlo Huertero · Yigüirro



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

ESTATUS Residente

OCURRENCIA Común

DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Passeriformes

FAMILIA

Turdidae

GÉNERO

Turdus

MEDIDAS

TAMAÑO

23-27
cm

PESO

74-76
g

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Bosques, jardines y zonas urbanas

⌚ Primeras horas de la mañana

Descripción

Zorzal robusto de 23 a 27 cm, de aspecto sobrio. Su plumaje es pardo uniforme, más cálido y ocráceo en las partes inferiores, con garganta clara estriada, pico amarillo verdoso, patas rosadas e iris rojizo. Forrajea en el suelo entre la hojarasca y come frutos; su canto melodioso es conspicuo. Habita arbolado, jardines y bordes urbanos.

¿Sabías que?

Es el ave nacional de Costa Rica, donde se le conoce como yigüirro, y su canto se asocia tradicionalmente con la llegada de las lluvias. Se ha beneficiado de los ambientes urbanos y agrícolas, expandiendo su distribución en las últimas décadas.

Cómo identificarla

Zorzal pardo uniforme, más cálido en el vientre, con pico amarillo verdoso, patas rosadas e iris rojizo. Su tamaño mediano, su comportamiento de saltar y escarbar en el suelo y su canto melodioso ayudan a reconocerlo. Carece de manchas o barras llamativas, lo que en sí mismo es diagnóstico.

Dónde y cuándo observarla

Arbolado, jardines y bordes con hojarasca y árboles frutales alrededor de la laguna y zonas urbanas adyacentes (estimado). Presente todo el año.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA

en línea · fauna.chirimoyo.org



Oropéndola Cabeza Castaña

Psarocolius wagleri (Gray, 1845)



OTROS NOMBRES Oropéndola cabecicastaña · Cacique cabecicastaño



(c) Kevin Brix, some rights reserved (CC BY-SA)

CC BY-SA 4.0

ESTADO

ESTATUS Residente

OCURRENCIA Poco común

DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Passeriformes

FAMILIA

Icteridae

GÉNERO

Psarocolius

MEDIDAS

TAMAÑO

28–35
cm

PESO

125–225
g

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Selva húmeda y bordes tropicales

⌚ Primeras horas de la mañana

Descripción

Ave de talla media a grande, de unos 35 a 40 cm. Su sello es la cabeza castaña y los ojos azules, que resaltan sobre el cuerpo negro y la brillante cola amarilla. El pico, largo y puntiagudo, es amarillo pálido y se ajusta a una dieta de frutos e insectos. Social, vive en grupos ruidosos y anida en colonias. En la laguna es poco común.

¿Sabías que?

Los machos realizan exhibiciones de cortejo inclinándose hacia adelante con las alas extendidas mientras emiten cantos líquidos y gorgoteantes muy característicos cerca de las colonias.

Cómo identificarla

Ave grande tipo zanate con cuerpo negro, cabeza y nuca de color castaño intenso y cola amarilla brillante con par central oscuro. Pico largo, puntiagudo y pálido (marfil), con placa frontal. Su cabeza castaña y cola amarilla la distinguen de la Oropéndola de Moctezuma (*Psarocolius montezuma*), que tiene cabeza negra y carúnculas faciales.

Dónde y cuándo observarla

Buscarla en árboles altos y emergentes circundantes al humedal, especialmente donde existan colonias con nidos colgantes conspicuos (estimado). Presente todo el año.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org






Oropéndola de Moctezuma

Psarocolius montezuma (Lesson, 1830)

OTROS NOMBRES Oropéndola Mayor · Zacua mayor



(c) Humberto, some rights reserved (CC BY-SA)

CC BY-SA 4.0

ESTADO

ESTATUS Residente

OCURRENCIA Común

DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

Pr

TAXONOMÍA

ORDEN

Passeriformes

FAMILIA

Icteridae

GÉNERO

Psarocolius

MEDIDAS

TAMAÑO

38–50
cm

PESO

230–520
g

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Selva húmeda, bordes y plantaciones

⌚ Primeras horas de la mañana

Descripción

Ave grande y vistosa de los ictéridos, con uno de los mayores dimorfismos sexuales de América: el macho ronda los 50 cm y casi duplica a la hembra. El cuerpo es castaño con cabeza y rabadilla negruzcas y cola amarilla salvo el par central. Destacan la mejilla azul desnuda, la carúncula rosada y el pico negro de punta naranja.

¿Sabías que?

Es uno de los pájaros con mayor dimorfismo sexual del mundo: el macho llega a pesar más del doble que la hembra. Su despliegue de cortejo —inclinarse de cabeza con las alas extendidas mientras emite un gorgoteo líquido y metálico— produce uno de los sonidos más característicos del trópico americano.

Cómo identificarla

Ave grande tipo zanate. El macho es inconfundible: cuerpo castaño, cabeza negra, cola amarillo brillante, mejilla azul desnuda, carúncula rosada y pico negro de punta naranja. La hembra es igual pero más pequeña. Se distingue de la Oropéndola Cabeza Castaña por la cabeza negra —no castaña— y por las carúnculas faciales.

Dónde y cuándo observarla

Buscarla en los árboles altos y emergentes alrededor del humedal y en sus orillas; las colonias delatan su presencia por los nidos colgantes y por el gorgoteo de los machos. Presente todo el año.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA

en línea · fauna.chirimoyo.org





Paloma Turca

Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)

OTROS NOMBRES Tórtola turca · Paloma de collar turca · Tórtola de collar



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

ESTATUS Residente

OCURRENCIA Común

DISTRIBUCIÓN Introducida

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Columbiformes

FAMILIA

Columbidae

GÉNERO

Streptopelia

MEDIDAS

PESO

125–240
g

ENVERGADURA

47–55
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Zonas urbanas y agrícolas

⌚ Primeras horas de la mañana

Descripción

Paloma de tamaño mediano a grande, de 30 a 33 cm, robusta y de coloración uniforme pardo grisácea a beige arenosa. Luce un estrecho collar negro bordeado de blanco en la nuca, rasgo que le da nombre, y cola larga con amplias puntas blancas. Especie introducida muy ligada a ambientes humanos; en el Chirimoyo se asocia a zonas urbanizadas y parques.

¿Sabías que?

Es una de las aves invasoras de expansión más rápida del continente; coloniza nuevas áreas siguiendo los paisajes modificados por el hombre y puede desplazar o competir con palomas nativas, además de mostrar comportamientos agresivos hacia otras especies.

Cómo identificarla

Coloración beige pálido uniforme con un fino collar negro semicircular en la nuca y amplias puntas blancas en la cola al volar. Es mayor y más pálida que las tórtolas nativas y carece del patrón escamado de la Tórtola Colilarga. Su tamaño grande, su collar y su vínculo con ambientes urbanos la separan de las columbinas pequeñas.

Dónde y cuándo observarla

Búsquela posada en cables, postes y tejados de las zonas urbanizadas y bordes con viviendas en la periferia del humedal (estimado). Presente todo el año.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org





Papamoscas Negro

Sayornis nigricans (Swainson, 1827)

OTROS NOMBRES Mosquero negro · Mosquero de agua · Cazamoscas negro



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

ESTATUS Residente

OCURRENCIA Común

DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Passeriformes

FAMILIA

Tyrannidae

GÉNERO

Sayornis

MEDIDAS

TAMAÑO

15–18
cm

PESO

15–22
g

ENVERGADURA

27–28
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Cerca de cuerpos de agua

⌚ Primeras horas de la mañana

Descripción

Pequeño papamoscas insectívoro ligado al agua, de 16 a 18 cm, con partes altas oscuras —negras o grises— y vientre pálido. Caza como los atrapamoscas: se posa en ramas o rocas y emprende vuelos breves para capturar insectos. Tolerancia ambientes semiurbanos, pero prefiere las cercanías del agua, por lo que es común en humedales como el Chirimoyo.

¿Sabías que?

Es uno de los pocos passeriformes que dependen estrechamente del agua; aprovecha estructuras humanas como puentes y muros para anidar, lo que le ha permitido prosperar en humedales urbanos.

Cómo identificarla

Papamoscas inconfundible de coloración negra a gris pizarra en cabeza, pecho y partes superiores, con vientre blanco neto que contrasta de forma marcada. Mueve la cola de arriba abajo al posarse. Su estrecha asociación con el agua y el patrón negro y blanco lo distinguen fácilmente de otros tiránidos; ambos sexos son iguales.

Dónde y cuándo observarla

Buscarlo posado en perchas bajas, rocas o estructuras junto a la orilla de la laguna, lanzándose sobre el agua (estimado). Presente todo el año.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org





Parula Tropical

Setophaga pitaiyumi (Vieillot, 1817)

OTROS NOMBRES Reinita Tropical · Chipe Tropical · Chipe azul olivo tropical · Pitaiyumí



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

ESTATUS Residente

OCURRENCIA Poco común

DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Passeriformes

FAMILIA

Parulidae

GÉNERO

Setophaga

MEDIDAS

PESO

5-8
g

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Dosel de bosques y bordes

⌚ Primeras horas de la mañana

Descripción

Diminuta y vivaz chipe de 9 a 11 cm, de colorido contrastante. Las partes superiores son azul grisáceas con un parche verde oliva en la espalda, y las inferiores de amarillo intenso que se torna anaranjado en pecho y garganta. Muestra dos barras alares blancas y una zona oscura alrededor del ojo. Forrajea con agilidad en el dosel.

¿Sabías que?

A diferencia de la parula nortea migratoria (*Setophaga americana*), esta especie es residente y depende estrechamente de la presencia de epífitas como el heno o musgo español (*Tillandsia*) para anidar, lo que la liga a bosques bien conservados.

Cómo identificarla

Busca el contraste entre las partes superiores azul grisáceas y el vientre amarillo intenso con pecho anaranjado, además de las dos barras alares blancas. Carece del anillo ocular partido de la parula nortea y muestra una mancha oscura alrededor del ojo. Su tamaño minúsculo y su forrajeo acrobático en el dosel ayudan a ubicarla.

Dónde y cuándo observarla

Dosel del arbolado alto y vegetación riparia con epífitas y musgos alrededor de la laguna (estimado). Presente todo el año.

Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org





Perlita Azulgris

Polioptila caerulea (Linnaeus, 1766)

OTROS NOMBRES Perlita grisilla · Perlita común · Perlita azul-gris



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

● ESTATUS Residente

● OCURRENCIA Común

● DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Passeriformes

FAMILIA

Poliophtilidae

GÉNERO

Poliophtila

MEDIDAS

TAMAÑO

10-13
cm

PESO

5-7
g

ENVERGADURA

16
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Bosques y matorrales abiertos

⌚ Primeras horas de la mañana

Descripción

Ave diminuta y estilizada, de 10 a 11 cm, con una cola larga que mueve nerviosamente. Es gris azulada por arriba y blanca por abajo, con anillo ocular blanco; el macho reproductor luce una fina ceja negra ausente en la hembra. La cola negra con bordes blancos es muy distintiva. Insectívoro inquieto, forrajea en el follaje ripario.

¿Sabías que?

Es la única perlita con poblaciones genuinamente migratorias; sin embargo, en las tierras tropicales del centro y sur de México mantiene poblaciones residentes que crían localmente todo el año.

Cómo identificarla

Ave muy pequeña, gris azulada arriba y blanca abajo, con anillo ocular blanco y cola larga que agita constantemente. La cola negra con bordes blancos y el comportamiento inquieto la delatan de inmediato. El macho reproductor muestra una fina ceja negra que la hembra no presenta.

Dónde y cuándo observarla

Arbolado y vegetación riparia que rodea la laguna, donde forrajea activamente en el follaje medio y alto (estimado). Presente todo el año.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org





Saltador Cabeza Negra

Saltator atriceps (Lesson, 1832)

OTROS NOMBRES Saltador cabecinegro · Pepitero cabecinegro · Chepito



(c) Gonzalo Zepeda Martínez, some rights reserved (CC BY-SA)

CC BY-SA
4.0

ESTADO

ESTATUS Residente

OCURRENCIA Poco común

DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Passeriformes

FAMILIA

Thraupidae

GÉNERO

Saltator

MEDIDAS

TAMAÑO

23-25
cm

PESO

63-116
g

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Matorrales y bordes de selva húmeda

⌚ Primeras horas de la mañana

Descripción

Mide cerca de 20 cm y es de constitución maciza. En su cabeza, de negro intenso, sobresale una pequeña garganta blanca; el resto combina manto verde oliva y pecho ceniciento. Su grueso pico cónico abre semillas y aprovecha frutos e insectos. Reside todo el año en México y Centroamérica, en selvas, bosques y arboledas, e incluye la laguna.

¿Sabías que?

Es muy vocal y a menudo se detecta antes por su canto fuerte y sus llamados ásperos que por la vista, ya que tiende a permanecer oculto en la vegetación densa. Suele desplazarse en grupos familiares ruidosos.

Cómo identificarla

Saltador grande y robusto con capucha negra contrastante, ceja blanca corta y una garganta blanca llamativa bordeada de negro. El dorso es verde oliva y las partes inferiores gris pálido con tonos oliváceos. Se distingue del Saltador Gris por su cabeza claramente negra y la garganta blanca enmarcada; ambos sexos son similares.

Dónde y cuándo observarla

Buscarlo en los matorrales densos, setos y la maleza arbustiva del borde de la laguna y la vegetación riparia (estimado). Presente todo el año.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org





Saltador Gris

Saltator grandis (Deppe, 1830)

OTROS NOMBRES Saltador gris mesoamericano · Pepitero ventricanelo · Saltador ventricanelo



(c) Aldous13, some rights reserved (CC BY)

CC BY 4.0

ESTADO

ESTATUS Residente

OCURRENCIA Común

DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Passeriformes

FAMILIA

Thraupidae

GÉNERO

Saltator

MEDIDAS

TAMAÑO

20–24
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Matorrales y vegetación secundaria abierta

🕒 Primeras horas de la mañana

Descripción

Ave de talla media, de 22 a 24 cm, de cuerpo robusto, cabeza gris oscura, garganta blanca y pecho gris pálido que vira a canela apagado hacia el vientre. Machos y hembras comparten coloración; los juveniles son más deslucidos. Su sello permanente son las cejas blancas. Come insectos y frutos. Su canto melodioso facilita localizarlo.

¿Sabías que?

Su canto es un silbido melodioso y musical, frecuente al amanecer. La taxonomía del complejo *Saltator coerulescens* fue dividida recientemente, reconociéndose *grandis* como especie plena (Saltador Gris o de vientre canela).

Cómo identificarla

Saltador mediano de coloración apagada, con cabeza y dorso gris pardusco, ceja blanca delgada, garganta blanquecina y vientre con tinte canela. Carece de la capucha negra y la garganta enmarcada del Saltador Cabeza Negra, lo que es la clave principal de separación. Su pico es grueso y cónico; ambos sexos son semejantes.

Dónde y cuándo observarla

Buscarlo en setos, matorrales y árboles bajos de las orillas y la vegetación circundante de la laguna (estimado). Presente todo el año.

Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org






Semillero Brincador

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766)

OTROS NOMBRES Semillero volatinero · Semillerito negro azulado · Espiguero saltarín · Negrillo



(c) Gonzalo Zepeda Martínez, some rights reserved (CC BY-SA)

CC BY-SA
4.0

ESTADO

● ESTATUS Residente

● OCURRENCIA Común

● DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Passeriformes

FAMILIA

Thraupidae

GÉNERO

Volatinia

MEDIDAS

TAMAÑO

10–11
cm

PESO

9–12
g

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Pastizales y campos abiertos

🕒 Primeras horas de la mañana

Descripción

Conocido también como espiguero saltador, es un pájaro menudo y energético de cerca de 10 cm. El macho luce un negro lustroso con reflejos azulados y un toque blanco en las alas; la hembra viste pardos discretos que la disimulan. Debe su nombre a su hábito de dar saltitos, sobre todo en el cortejo. Se alimenta de semillas y pequeños insectos.

¿Sabías que?

El macho realiza un despliegue muy llamativo saltando en el aire repetidamente desde una percha mientras emite un zumbido metálico, exhibiendo la mancha alar blanca; este comportamiento le da el nombre de 'brincador'.

Cómo identificarla

Granívoro muy pequeño; el macho reproductivo es negro azulado lustroso con una mancha axilar blanca visible al saltar o volar. La hembra y los machos no reproductivos son pardos con el pecho estriado, semejando a otros semilleros hembra. Su conducta diagnóstica es el salto vertical del macho mientras canta, que da origen a su nombre común.

Dónde y cuándo observarla

Buscarlo en los pastizales y matorrales abiertos de las orillas y áreas despejadas alrededor de la laguna (estimado). Presente todo el año.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Semillero de Collar

Sporophila morelleti Bonaparte, 1850



OTROS NOMBRES Semillero cuelliblanco · Semillero de Morelet · Espiguero de Morelet



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

ESTATUS Residente

OCURRENCIA Común

DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Passeriformes

FAMILIA

Thraupidae

GÉNERO

Sporophila

MEDIDAS

TAMAÑO

9.5–11.25
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Pastizales, matorrales y bordes húmedos

⌚ Primeras horas de la mañana

Descripción

Pajarito vistoso de 10 a 12 cm. En celo, el macho puede ser negro y blanco o grisáceo, mientras la hembra mantiene un pardo claro uniforme que la camufla. A ambos los delatan dos barras blancas en las alas, que los separan de otros semilleros. Se nutre de semillas de pastos y hierbas, y de pequeños insectos. Dispersa semillas y controla malezas.

¿Sabías que?

Antes se incluía en el complejo del Semillero de Collar (*Sporophila torqueola*); las poblaciones del este fueron separadas como *S. morelleti*, dedicada al naturalista Arthur Morelet. El macho tiene un canto variado y melodioso.

Cómo identificarla

Semillero pequeño de pico cónico grueso; el macho presenta capucha negra, collar y partes inferiores blancas y, según la edad, un parche alar blanco. La hembra y los inmaduros son de tono pardo amarillento uniforme, más apagados, difíciles de identificar sin un macho. El collar y la garganta blanca del macho son la clave diagnóstica.

Dónde y cuándo observarla

Buscarlo en los pastizales altos, herbazales y bordes de tular o vegetación riparia que rodean la laguna (estimado). Presente todo el año.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Tángara Alamarilla

Thraupis abbas (Deppe, 1830)



OTROS NOMBRES: Tangara Alas Amarillas · Azulejo buscahigo · Carbonero



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

ESTATUS Residente

OCURRENCIA Común

DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Passeriformes

FAMILIA

Thraupidae

GÉNERO

Thraupis

MEDIDAS

TAMAÑO

17–18
cm

PESO

38–55
g

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Bosques, bordes y zonas semiabiertas

⌚ Primeras horas de la mañana

Descripción

Tángara mediana de unos 18 cm, sobria a la distancia pero atractiva de cerca. La cabeza es azul lavanda pálido y contrasta con el cuerpo gris azulado. Su rasgo más distintivo es el amplio parche amarillo brillante en las alas, visible en percha y vuelo. Gregaria y bulliciosa, se desplaza en grupos por el dosel y los árboles frutales.

¿Sabías que?

En las últimas décadas ha expandido su distribución hacia el noreste de México, llegando a Tamaulipas y Nuevo León, probablemente favorecida por la urbanización y los huertos frutales.

Cómo identificarla

Busca el conspicuo parche amarillo en las alas sobre un cuerpo gris azulado y la cabeza lavanda pálido. Su comportamiento gregario y ruidoso en parejas o grupos pequeños en árboles frutales facilita su detección. El amarillo alar es la mejor marca de campo a cualquier distancia.

Dónde y cuándo observarla

Dosel del arbolado y árboles frutales alrededor de la laguna y en las zonas urbanas y de cultivo adyacentes (estimado). Presente todo el año.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Tórtola Colilarga

Columbina inca (Lesson, 1847)



OTROS NOMBRES Tortolita cola larga · Tórtola inca · Coquita



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

ESTATUS Residente

OCURRENCIA Común

DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Columbiformes

FAMILIA

Columbidae

GÉNERO

Columbina

MEDIDAS

TAMAÑO

16.5–23
cm

PESO

30–58
g

ENVERGADURA

28.5–32
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Zonas urbanas y matorrales secos

⌚ Primeras horas de la mañana

Descripción

Paloma pequeña y esbelta, de 18 a 23 cm, de aspecto delicado y cola notablemente larga. Su plumaje pardo grisáceo claro muestra un patrón escamado, pues cada pluma tiene un borde oscuro. En vuelo exhibe parches rufos en las alas y bordes blancos en la cola. Camina por el suelo buscando semillas; en el Chirimoyo abunda en bordes urbanos y cultivos.

¿Sabías que?

Su canto, un arrullo monótono y repetitivo que suele interpretarse como un melancólico 'no hope' en inglés, se escucha durante buena parte del día; en las noches frías es común verlas apiñadas en grupos para conservar el calor.

Cómo identificarla

Clave de campo: patrón escamado en todo el cuerpo, cola larga con bordes blancos y parches rufos en las alas visibles al volar. Se distingue de la Tortolita Pico Rojo (*Columbina passerina*) por su cola mucho más larga y por el escamado más extendido y marcado. Su silueta esbelta y su larga cola la hacen reconocible incluso a distancia.

Dónde y cuándo observarla

Búsquela caminando en el suelo de jardines, bordes urbanos y terrenos abiertos con cultivos en la periferia del humedal (estimado). Presente todo el año.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA

en línea · fauna.chirimoyo.org



Vireo Anteojo

Vireo solitarius (Wilson, 1810)



OTROS NOMBRES Vireo solitario · Vireo cabeciazul · Vireo de anteojos



(c) Adrianh M. Orozco, some rights reserved (CC BY)

CC BY 4.0

ESTADO

● ESTATUS Migratoria de invierno

● OCURRENCIA Común

● DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Passeriformes

FAMILIA

Vireonidae

GÉNERO

Vireo

MEDIDAS

TAMAÑO

12.6–14.8
cm

PESO

13–19
g

ENVERGADURA

20–24
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Bosques mixtos y de coníferas

🕒 Primeras horas de la mañana

Descripción

Pequeño vireo migratorio de 12 a 14 cm, gris verdoso por encima, con un anillo ocular blanco que le da aspecto de llevar anteojos. Garganta y vientre casi blancos y flancos con leve tinte amarillento. Es básicamente insectívoro, aunque también toma frutos. Activo, recorre las ramas medias y altas en busca de alimento.

¿Sabías que?

Antes formaba parte del 'Solitary Vireo', complejo que se dividió en tres especies (Vireo de Cassin, Vireo Plomizo y este, el Vireo Anteojo o de cabeza azul). Llega a México hacia finales de septiembre y la mayoría parte antes de mediados de mayo.

Cómo identificarla

Vireo robusto con cabeza gris azulada que contrasta con un anteojo blanco completo y conspicuo (anillo ocular más línea loreal), de donde viene su nombre. Dorso verde oliva, dos barras alares blancas y costados con tinte amarillo verdoso. El contraste entre la capucha gris y la 'mascarilla' blanca lo separa de otros vireos; ambos sexos son iguales.

Dónde y cuándo observarla

Buscarlo en el follaje de los árboles y la vegetación riparia arbórea que circundan la laguna (estimado). Presencia principal: Octubre a abril (estimado).



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimo.org



Zanate Mayor

Quiscalus mexicanus (Gmelin, 1788)



OTROS NOMBRES Zanate mexicano · Clarinero · Chanate



Any Isabel Pérez Santiago

CC0

ESTADO

● ESTATUS Residente

● OCURRENCIA Común

● DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Passeriformes

FAMILIA

Icteridae

GÉNERO

Quiscalus

MEDIDAS

TAMAÑO

33-43
cm

PESO

102-253
g

ENVERGADURA

48-58
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Zonas abiertas, urbanas y agrícolas

🕒 Primeras horas de la mañana

Descripción

Conocido también como tordo mexicano, es un ave de talla media, de 24 a 30 cm. Su plumaje negro despidе reflejos iridiscentes entre el azul y el púrpura según la luz. Su pico fuerte y algo curvo aprovecha alimentos diversos: insectos, frutos y granos. Muy adaptable, prospera en campo y ciudad. Vive en sociedad y posee variado repertorio vocal.

¿Sabías que?

Posee un repertorio vocal amplio y estridente; su exitosa expansión territorial lo convierte en uno de los íctéridos más conspicuos y adaptables de las ciudades mexicanas.

Cómo identificarla

Zanate grande con marcado dimorfismo sexual: el macho es negro lustroso con iridiscencia púrpura-azulada, ojos amarillos y cola larga en forma de quilla (en V); la hembra es notablemente más pequeña, de color pardo a café con partes inferiores más claras y también ojo pálido. El gran tamaño y la cola aquillada del macho lo hacen inconfundible.

Dónde y cuándo observarla

Buscarlo en las orillas de la laguna, el tular y la vegetación riparia, así como posado en árboles y estructuras del entorno urbano, frecuentemente en bandadas ruidosas (estimado). Presente todo el año.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Hecho por la comunidad, para el *humedal*



Chirimoyo
HUMEDAL • ORIZABA

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS

Any Isabel Pérez Santiago	47
Adrianh M. Orozco	CC BY 5
Gonzalo Zepeda Martínez	CC BY-SA 3
Kevin Brix	CC BY-SA 2
Aldous13	CC BY 1
Humberto	CC BY-SA 1
MarvalPhotography19	CC BY 1
Nick Block	CC BY 1
Vicencio de la Cruz-Francisco	CC BY-SA 1
Victor De la Cruz	CC BY 1
Xochitl Zambrano	CC BY 1

Fotógrafos de la colección (nº de fotos). La atribución de cada foto aparece en su ficha.

FUENTES CONSULTADAS

-  **eBird**
Cornell Lab of Ornithology
-  **Enciclovida**
CONABIO · México
-  **Birds of the World**
Cornell Lab
-  **BirdLife / UICN**
Estado de conservación



LICENCIAS

Salvo indicación contraria, las fotografías se publican bajo **CC BY-NC 4.0** y los textos bajo **CC BY-SA 4.0**. Puedes compartirlos y adaptarlos sin fines de lucro, citando a «Comunidad Chirimoyo».

CÓMO CONTRIBUIR

Defiende el humedal de Chirimoyo



Aprende a reconocer las especies del humedal con esta guía y el catálogo en línea.



Súmate a las jornadas de limpieza y reforestación de las orillas.



Reporta descargas, rellenos o caza al comité del humedal.



FAUNA.CHIRIMOYO.ORG
Únete al proyecto