



Chirimoyo
HUMEDAL · ORIZABA

GUÍA DE CAMPO
Edición 2026

HUMEDAL DE AGUA DULCE · VERACRUZ, MÉXICO

Catálogo de herpetofauna del humedal de *Chirimoyo*

— Comunidad Chirimoyo · Orizaba, Veracruz

LITHOBATES BERLANDIERI

«12 especies que sostienen la vida del humedal»

12 especies documentadas
VERSIÓN 2026

Proyecto comunitario
de conservación del humedal



Un humedal vivo y diverso

El humedal de *Chirimoyo*, es una laguna urbana al norte de Orizaba que filtra el agua, amortigua las inundaciones y da refugio a decenas de especies. Es una de las últimas zonas húmedas vivas de la ciudad.

Esta guía reúne los anfibios y reptiles que la comunidad ha observado y documentado. Cada ficha resume, en una sola página, lo esencial para reconocer una especie en el campo y entender su papel en el ecosistema. Consérvala seca, llévala al campo y compártela: conocer estas especies es el primer paso para defender el humedal.

CÓMO USAR ESTA GUÍA



Observa y compara

Fíjate en tamaño, forma, color y dónde está el animal.



Lee la ficha

Las insignias resumen estatus, rareza y protección.



Mira más en línea

Escanea el QR de cada ficha: más fotos, cantos y su mapa.

Cómo leer la ficha

SISTEMA DE INSIGNIAS

Estatus migratorio

PRESENCIA

- Residente** Vive en el humedal todo el año.
- Migratoria de invierno** Visita en la temporada fría.
- Migratoria de verano** Llega a reproducirse en la época cálida.
- Transitoria** Solo de paso durante la migración.

Grado de ocurrencia

QUÉ TAN SEGUIDO

- Común** Se observa con facilidad en cada visita.
- Poco común** Aparece de vez en cuando.
- Rara** Registros escasos o esporádicos.

Distribución

ORIGEN

- Nativa** Propia de la región de forma natural.
- Introducida** Traída por el ser humano, no nativa.

Conservación

IUCN • NOM-059

- IUCN **LC** IUCN **NT** IUCN **VU**
IUCN **EN** IUCN **CR**

Lista Roja: de **LC** (preocupación menor) a **CR** (peligro crítico).

- NOM-059 **Pr** NOM-059 **A** NOM-059 **P**
NOM-059 **E**

Norma mexicana: **Pr** sujeta a protección, **A** amenazada, **P** en peligro, **E** probablemente extinta. «—» sin categoría.

CONSULTA EN LÍNEA

Fichas ampliadas, cantos y mapas de cada especie, y cómo sumarte a la defensa del humedal.



Índice de especies

12 especies del humedal, agrupadas por clase

12
ESPECIES

5
CLASES

Anuros ● 7 esp.

Rana Arborícola	<i>Smilisca baudinii</i>	01
Rana Chirriadora	<i>Eleutherodactylus cystignathoides</i>	02
Rana de Orejas Chicas	<i>Rheohyla miotympanum</i>	03
Rana Leopardo	<i>Lithobates berlandieri</i>	04
Ranita Grillo	<i>Tlalocohyla picta</i>	05
Sapo Costero	<i>Incilius valliceps</i>	06
Sapo de Caña	<i>Rhinella horribilis</i>	07

Salamandras ● 1 esp.

Tlaconete	<i>Bolitoglossa platydactyla</i>	08
-----------	----------------------------------	----

Lagartijas ● 2 esp.

Iguana Verde	<i>Iguana iguana</i>	09
Lagartija escamosa	<i>Sceloporus grammicus</i>	10

Serpientes ● 1 esp.

Culebra Listonada	<i>Thamnophis proximus</i>	11
-------------------	----------------------------	----

Tortugas ● 1 esp.


Tortuga / Jicotea	<i>Trachemys venusta</i>	12
-------------------	--------------------------	----

Rana Arborícola

Smilisca baudinii (Duméril & Bibron, 1841)



OTROS NOMBRES Rana arborícola mexicana · Rana arbórea de Baudin · Rana trepadora



(c) Genaro Sanchez, some rights reserved (CC BY-NC)

CC BY-NC 4.0

ESTADO

● **ESTATUS** Residente

● **OCURRENCIA** Común

● **DISTRIBUCIÓN** Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Anura

FAMILIA

Hylidae

GÉNERO

Smilisca

MEDIDAS

LHC (HOCICO-
CLOACA)

5-6
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Asentamientos humanos, bosque de niebla y cuerpos de agua · vegetación arbustiva y arbórea cercana al agua.

🕒 Noche, especialmente tras lluvias

Descripción

La Rana Arborícola es una de las hílidas mayores y más abundantes del humedal, de hasta 6 cm. Cuerpo robusto, piel lisa y color variable con manchas oscuras sobre fondo café, crema u oliváceo, y vientre granular crema. Sus discos adhesivos le permiten trepar. Nocturna, tolerante y muy conspicua.

¿Sabías que?

Su gran plasticidad ecológica y tolerancia a la perturbación explican su abundancia en el humedal. Es una de las ranas más representativas de los coros nocturnos de lluvia. Los discos adhesivos y su comportamiento trepador la distinguen fácilmente de las ranas terrestres del sitio.

Cómo identificarla

Rana mediana-grande (~6 cm), café-oliváceo con manchas oscuras irregulares, vientre crema granular, discos adhesivos en los dedos; canto potente.

Dónde y cuándo observarla

Arbustos, árboles y hierbas cerca del cuerpo de agua y vegetación del humedal (estimado). Temporada: Más activa y vocal durante la temporada de lluvias (junio a septiembre), formando coros tras las precipitaciones.

Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Rana Chirriadora

Eleutherodactylus cystignathoides (Cope, 1877)



OTROS NOMBRES Ranita chirriadora del Río Bravo · Rana chirriadora del Río Grande



(c) joabhdz, some rights reserved (CC BY-NC)

CC BY-NC 4.0

ESTADO

ESTATUS Residente

OCURRENCIA Común

DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Anura

FAMILIA

Eleutherodactylidae

GÉNERO

Eleutherodactylus

MEDIDAS

LHC (HOCICO-
CLOACA)

1.6–2.6
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Asentamientos humanos, pastizales, cultivos y vegetación baja con hojarasca húmeda.

Noche, tras la puesta del sol

Descripción

La Rana Chirriadora es el anuro más pequeño del Chirimoyo, de unos 2 cm. Cuerpo esbelto y aplanado, hocico puntiagudo y color café o grisáceo con jaspeado oscuro que la camufla en la hojarasca. Su nombre alude al canto agudo de los machos. Discreta pero localmente abundante, tolera bien lo urbano.

¿Sabías que?

Su capacidad de dispersión asociada al transporte de plantas ornamentales ha favorecido su expansión. Es indicadora de tolerancia a la perturbación; su presencia en jardines y cultivos del humedal refleja un alto grado de adaptación a paisajes humanizados.

Cómo identificarla

Rana diminuta (~2 cm), café-grisácea con jaspeado oscuro, hocico puntiagudo, cuerpo aplanado, discos digitales pequeños; canto agudo tipo chirrido o pitido.

Dónde y cuándo observarla

Hojarasca, hierbas y bordes de cultivos, jardines y asentamientos humanos del humedal (estimado). Temporada: Mayor detección durante la temporada de lluvias (junio a septiembre), cuando incrementa el canto y la actividad nocturna.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Rana de Orejas Chicas

Rheohyla miotympanum (Cope, 1863)



OTROS NOMBRES Rana de orejas chicas · Calate



(c) benmun89, some rights reserved (CC BY-NC)

CC BY-NC 4.0

ESTADO

ESTATUS Residente

OCURRENCIA Poco común

DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

Pr

TAXONOMÍA

ORDEN

Anura

FAMILIA

Hylidae

GÉNERO

Rheohyla

MEDIDAS

LHC (HOCICO-
CLOACA)

3.1-3.9
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Asentamientos humanos, bosque de niebla y cuerpos de agua · vegetación herbácea y arbustiva en bordes de arroyos.

Noche, durante el coro de cantos

Descripción

La Rana de Orejas Chicas es una hílida endémica de México y pequeña: la hembra ronda 3.9 cm y el macho 3.1 cm. Su rasgo distintivo es el tímpano reducido. Verde brillante o amarillo verdoso, se confunde con el follaje. Nocturna y generalista, habita bosque mesófilo y pastizales junto al agua.

¿Sabías que?

Por su endemismo y su categoría de Protección Especial en la NOM-059, su presencia da valor de conservación al humedal. En el Chirimoyo se verificó sobre todo por registros auditivos. Su dependencia del agua y de la vegetación ribereña la hace sensible a la degradación del hábitat acuático.

Cómo identificarla

Rana pequeña (3-4 cm) verde brillante o amarillo verdoso, tímpano reducido (orejas chicas); asociada a vegetación junto al agua.

Dónde y cuándo observarla

Arbustos y hierbas en los bordes del cuerpo de agua y vegetación ribereña del humedal (estimado). Temporada: Detectable sobre todo en la temporada de lluvias (junio a septiembre), cuando los machos cantan junto al agua.

Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Rana Leopardo

Lithobates berlandieri (Baird, 1859)



OTROS NOMBRES Rana leopardo del Río Grande · Rana leopardo del Río Bravo · Lixut



(c) Carlos M Vieyra-Rojas, some rights reserved (CC BY-NC) CC BY-NC 4.0

ESTADO

ESTATUS Residente

OCURRENCIA Común

DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

Pr

TAXONOMÍA

ORDEN

Anura

FAMILIA

Ranidae

GÉNERO

Lithobates

MEDIDAS

LHC (HOCICO-CLOACA)

6-10
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Cuerpos de agua (lagunas, ríos, arroyos, charcas), acahuales, pastizales y asentamientos humanos cercanos al agua

Noche, en las orillas y dentro de los cuerpos de agua

Descripción

La Rana Leopardo es acuática, mediana a grande (6-10 cm). Su dorso gris-verde a verde metálico luce grandes manchas oscuras redondeadas que recuerdan a un leopardo. De cuerpo esbelto y pliegues dorsolaterales marcados, es nocturna y muy ligada al agua. Salta al agua ante cualquier disturbio.

¿Sabías que?

En la guía/documento local aparece citada como 'Rana berlandieri'. Su estatus de Protección especial bajo la NOM-059 obliga a un manejo cuidadoso y a evitar su captura o perturbación. Es importante no confundirla con otras ranas leopardo del complejo *Lithobates* presentes en México.

Cómo identificarla

Rana mediana-grande, dorso verde-grisáceo con grandes manchas oscuras tipo leopardo, pliegues dorsolaterales marcados y cabeza puntiaguda.

Dónde y cuándo observarla

Orillas herbáceas y dentro de los cuerpos de agua (lagunas, charcas, arroyos) del humedal (estimado). Temporada: Más activa y reproductiva durante la temporada de lluvias (junio a septiembre); detectable por su canto y por individuos saltando al agua en las noches húmedas.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Ranita Grillo

Tlalocohyla picta (Günther, 1901)



OTROS NOMBRES Rana de árbol pintada · Ranita pintada · Ranita arborícola · X-túuts



(c) Ismael Jauregui Bulbarela, some rights reserved (CC BY-NC 4.0)

ESTADO

ESTATUS Residente

OCURRENCIA Común

DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Anura

FAMILIA

Hylidae

GÉNERO

Tlalocohyla

MEDIDAS

LHC (HOCICO-CLOACA)

2-3
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Bosque de niebla, cuerpos de agua, humedales, charcas y vegetación ribereña

Noche, tras la puesta del sol, en especial durante o después de la lluvia

Descripción

La Ranita Grillo es una pequeña hílida arborícola de menos de 3 cm. Su dorso es verde brillante, a veces dorado, con una franja lateral clara bordeada de oscuro. Tiene discos adhesivos para trepar. Nocturna y ligada a aguas someras, es el anfibio más registrado del humedal.

¿Sabías que?

Hasta hace poco existía un solo registro en la Laguna del Chirimoyo, pero en 2025 se observaron varios individuos sobre plantas del espejo de agua, lo que sugiere una población establecida. Su canto tipo grillo es una clave útil de detección auditiva nocturna durante las lluvias.

Cómo identificarla

Rana muy pequeña (hasta ~3 cm), verde brillante a dorada, con franja lateral clara bordeada de oscuro y discos adhesivos en los dedos.

Dónde y cuándo observarla

Vegetación emergente, hierbas y arbustos sobre el espejo de agua y bordes del humedal de bosque de niebla (estimado). Temporada: Mayor actividad y canto durante la temporada de lluvias (junio a septiembre), especialmente en noches húmedas y posteriores a precipitaciones.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Sapo Costero

Incilius valliceps (Wiegmann, 1833)



OTROS NOMBRES Sapo del Golfo · Sapo de la costa del Golfo



(c) Tereso Hernández Morales, some rights reserved (CC BY)

CC BY
4.0

ESTADO

ESTATUS Residente

OCURRENCIA Común

DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Anura

FAMILIA

Bufonidae

GÉNERO

Incilius

MEDIDAS

LHC (HOCICO-
CLOACA)

7-10
cm

PESO

50-100
g

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Asentamientos humanos, cuerpos de agua, pastizales y cultivos.

🕒 Noche, sobre todo tras la lluvia.

Descripción

Sapo mediano y robusto (7-10 cm), de piel rugosa y tuberculada en tonos café o grisáceo, a menudo con franja clara dorsal. Su rasgo diagnóstico son las crestas óseas que forman un valle entre los ojos. Los machos cantan con saco vocal. Nocturno y tolerante, común en casas, jardines y orillas.

¿Sabías que?

Al igual que otros bufónidos, secreta sustancias tóxicas por sus glándulas parótidas como defensa; su canto, un trino o gorjeo de los machos, es una señal frecuente en las noches lluviosas del humedal.

Cómo identificarla

Reconocible por las crestas cefálicas muy marcadas que forman un surco o valle entre los ojos y por la franja clara dorsal. Se distingue del Sapo de Caña (*Rhinella horribilis*) por su menor tamaño y por las crestas craneales más prominentes y angulosas.

Dónde y cuándo observarla

Búsquese en orillas, hojarasca y vegetación baja cerca del agua, así como en jardines y calles iluminadas próximas al humedal (estimado). Temporada: Mayo a octubre, con mayor actividad en la temporada de lluvias (estimado).



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Sapo de Caña

Rhinella horribilis (Wiegmann, 1833)



OTROS NOMBRES Sapo gigante · Sapo marino · Sapo grande · Sapo bocón



(c) Ismael Jauregui Bulbarela, some rights reserved (CC BY-NC 4.0)

ESTADO

ESTATUS Residente

OCURRENCIA Poco común

DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Anura

FAMILIA

Bufonidae

GÉNERO

Rhinella

MEDIDAS

LHC (HOCICO-CLOACA)

10-17
cm

PESO

200-1300
g

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Asentamientos humanos, cuerpos de agua, pastizales y cultivos.

Noche, sobre todo tras la lluvia.

Descripción

El anfibio mayor del Chirimoyo: un sapo robusto de hasta 17 cm, de piel muy rugosa y verrugosa en tonos pardos que lo camuflan. Destacan sus enormes glándulas parótidas triangulares tras los ojos y las crestas óseas de la cabeza. Nocturno y tolerante a lo urbano, aparece en orillas y bajo las luces.

¿Sabías que?

Sus glándulas parótidas producen bufotoxinas y bufadienólidos que pueden intoxicar a depredadores y mascotas que intentan morderlo; en torno a esta especie existen mitos populares sin fundamento, como que succiona sangre o que su orina daña la piel.

Cómo identificarla

Se identifica por su gran tamaño, piel muy verrugosa y, sobre todo, las voluminosas glándulas parótidas triangulares tras los ojos. Se distingue del Sapo Costero (*Incilius valliceps*) por ser más grande y pesado y por carecer del surco de crestas cefálicas en valle típico de aquel.

Dónde y cuándo observarla

Búsquese sobre el suelo y la hojarasca de las orillas, pastizales y zonas perturbadas cercanas a viviendas y luces del humedal (estimado). Temporada: Mayo a octubre, con mayor actividad en la temporada de lluvias (estimado).

Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Tlaconete

Bolitoglossa platydactyla (Gray, 1831)



OTROS NOMBRES Salamandra lengua de hongo de pies anchos · Salamandra de pies planos · Tlaconete de Veracruz



Francisco Castellanos

CC0

ESTADO

ESTATUS Residente

OCURRENCIA Rara

DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

Pr

TAXONOMÍA

ORDEN

Caudata

FAMILIA

Plethodontidae

GÉNERO

Bolitoglossa

MEDIDAS

LHC (HOCICO-CLOACA)

9-14
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Bosque de niebla, hojarasca y vegetación húmeda · tolera asentamientos humanos, pastizales y cultivos.

Noche húmeda, sobre todo tras la lluvia.

Descripción

Única salamandra del Chirimo: anfibio esbelto de 9 a 14 cm, oscuro, con una amplia franja dorsal amarillenta a dorada. Como pletodóntido carece de pulmones y respira por la piel, por lo que depende de la humedad. Tiene dedos anchos y palmeados. Nocturna, discreta e inofensiva, está en la NOM-059.

¿Sabías que?

Al carecer de pulmones realiza todo su intercambio gaseoso por la piel, lo que la hace muy sensible a la sequedad y a la contaminación, convirtiéndola en una buena indicadora de la calidad ambiental del humedal.

Cómo identificarla

Se reconoce por su cuerpo alargado de salamandra, coloración oscura con una franja dorsal amarillenta o dorada y dedos anchos y palmeados. Es la única especie con forma de salamandra en el humedal, por lo que no se confunde con los sapos ni ranas presentes.

Dónde y cuándo observarla

Búsqese de noche entre hojarasca húmeda, bajo troncos y en vegetación baja de las zonas más frescas y conservadas del humedal (estimado). Temporada: Mayo a octubre, con mayor actividad en noches húmedas de la temporada de lluvias (estimado).



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Iguana Verde

Iguana iguana (Linnaeus, 1758)



OTROS NOMBRES Iguana verde, iguana común, garrobo (regional)



(c) Maksymilian Wojtkiewicz, some rights reserved (CC BY-NC)

CC BY-NC
4.0

ESTADO

● **ESTATUS** Residente

● **OCURRENCIA** Poco común

● **DISTRIBUCIÓN** Introducida

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

Pr

TAXONOMÍA

ORDEN

Squamata

FAMILIA

Iguanidae

GÉNERO

Iguana

MEDIDAS

LONGITUD TOTAL
(HOCICO-COLA)

100–200
cm

PESO

1000–5000
g

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Vegetación arbórea ribereña, bordes de cuerpos de agua y zonas perturbadas con arbolado · en este sitio montañoso aparece de forma puntual fuera de su hábitat tropical natural.

⌚ Media mañana a mediodía, durante el asoleo en ramas altas.

Descripción

La iguana verde es el lagarto más grande de la región: cuerpo robusto con cresta de espinas dorsales. Verde en juveniles, gris verdoso o pardusco en adultos, con gran papada y una escama sub timpánica agrandada diagnóstica. Arborícola y termófila; a 1230 m sugiere ejemplares introducidos.

¿Sabías que?

Fuera de su nicho térmico, los individuos del Chirimoyo deben leerse como introducidos o translocados, no nativos. Especie protegida por la NOM-059 (Pr) y regulada por CITES (Apéndice II) por la presión del comercio de mascotas. Inofensiva, aunque puede morder y dar coletazos si se le manipula.

Cómo identificarla

Lagarto grande verde a pardo con cresta de espinas dorsales, gran papada gular y una escama redondeada agrandada bajo el tímpano; cola larga y anillada.

Dónde y cuándo observarla

Vegetación arbórea y arbustiva ribereña en torno al espejo de agua y áreas perturbadas con árboles soleados (estimado). Temporada: Registros dispersos a lo largo del año, con mayor detectabilidad en días cálidos y soleados; presencia ligada a posibles liberaciones puntuales.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Lagartija escamosa

Sceloporus grammicus Sceloporus grammicus Wiegmann, 1828



OTROS NOMBRES Lagartija espinosa del mezquite · Lagartija escamosa de mezquite · Chintete de mezquite · Lagartija espinosa del mezquital



Any Isabel Pérez Santiago (CC0)

CC0

ESTADO

- ESTATUS Residente
- OCURRENCIA Común
- DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN LC NOM-059 —

TAXONOMÍA

ORDEN	Squamata
FAMILIA	Phrynosomatidae
GÉNERO	Sceloporus

MEDIDAS

LONGITUD TOTAL
(HOCICO-COLA)

10–17.5
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Muros, rocas y troncos soleados en bordes de humedal y zonas montañosas

⌚ Media mañana y media tarde, durante las horas soleadas

Descripción

Lagartija pequeña a mediana, de cuerpo aplanado y cola larga. Dorso pardo, oliváceo o grisáceo, jaspeado, con tres a seis barras transversales oscuras. Escamas dorsales grandes, imbricadas y fuertemente quilladas, ásperas. Los machos exhiben manchas azules con jaspeado negro en garganta y costados.

¿Sabías que?

La determinación de especie es TENTATIVA y se basa en fotografías; el género *Sceloporus* es seguro, pero podría ser *S. variabilis* u otra afín. Los registros muestran individuos sobre muros y rocas, con dorso pardo barrado y escamas quilladas, coherentes con *S. grammicus*. Conviene confirmar en mano.

Cómo identificarla

Para separarla de *S. variabilis* observe: escamas dorsales grandes, fuertemente quilladas y espinosas, y un dorso con 3–6 barras transversales oscuras. *S. variabilis* tiene dos líneas dorsolaterales claras amarillentas, en los machos una mancha rosada bordeada de azul en el vientre, y menor talla.

Dónde y cuándo observarla

Microhábitat antropizado y rocoso del borde del humedal: muros de concreto, mampostería y afloramientos de roca al sol, donde se asolea y vigila; tolera bien ambientes perturbados (estimado). Temporada: activa todo el año, con mayor actividad en días cálidos y soleados (estimado).



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Culebra Listonada

Thamnophis proximus (Say, 1823)



OTROS NOMBRES Jarretera · Culebra acuática centroamericana



Any Isabel Pérez Santiago (CC0)

CC0

ESTADO

ESTATUS Residente

OCURRENCIA Poco común

DISTRIBUCIÓN Nativa

CONSERVACIÓN

IUCN

LC

NOM-059

A

TAXONOMÍA

ORDEN

Squamata

FAMILIA

Colubridae

GÉNERO

Thamnophis

MEDIDAS

LONGITUD TOTAL
(HOCICO-COLA)

50–120
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Vegetación de orillas, charcas, canales y márgenes del humedal · especie estrictamente ligada al agua.

Mañana y media tarde, durante el forrajeo diurno cerca del agua.

Descripción

Culebra esbelta de cola muy larga, hasta un tercio del total. Patrón inconfundible: fondo dorsal pardo oscuro a casi negro con tres líneas claras longitudinales, amarillentas a verdosas. Cabeza estrecha y ojos grandes, diurna. Muy ligada al agua, huye rápido. Inofensiva, no venenosa y sin riesgo.

¿Sabías que?

INOFENSIVA: no es venenosa, sin colmillos inoculadores, y ante una persona huye al agua. Ayuda a controlar anfibios y peces. Catalogada como Amenazada (A) en la NOM-059, evítese su captura. Sus tres líneas claras sobre fondo oscuro la delatan; no la confunda con especies peligrosas.

Cómo identificarla

Serpiente delgada de cola muy larga, oscura, con tres líneas claras (amarillas o verdosas) a lo largo del cuerpo; cabeza estrecha.

Dónde y cuándo observarla

Orillas con vegetación, juncos y herbáceas al borde del espejo de agua y charcas del humedal (estimado). Temporada: Activa en temporada cálida y lluviosa; mayor avistamiento al desplazarse entre la vegetación de la orilla durante el día.

Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Tortuga / Jicotea

Trachemys venusta (Gray, 1856)



OTROS NOMBRES Jicotea, tortuga resbaladora mesoamericana, tortuga de monte (regional)



(c) Luna Lunera, some rights reserved (CC BY-NC)

CC BY-NC 4.0

ESTADO

● **ESTATUS** Residente

● **OCURRENCIA** Rara

● **DISTRIBUCIÓN** Introducida

CONSERVACIÓN

IUCN

NE

NOM-059

—

TAXONOMÍA

ORDEN

Testudines

FAMILIA

Emyidae

GÉNERO

Trachemys

MEDIDAS

LARGO DEL
CAPARAZÓN

19–35
cm

HÁBITAT Y OBSERVACIÓN

Lagunas, ríos lentos y humedales con vegetación acuática y sitios de asoleo · en este sitio montañoso su presencia es marginal y requiere confirmación.

🕒 Media mañana, durante el asoleo sobre troncos y orillas.

Descripción

Tortuga dulceacuícola mediana a grande, de caparazón ovalado pardo a verde oliva, con líneas amarillas en juveniles. Cabeza, cuello y patas con finas líneas amarillas. Con la edad muchos se oscurecen o vuelven melánicos. Acuática, se asolea sobre troncos. El único registro local es marginal.

¿Sabías que?

Atención taxonómica: bajo 'Trachemys venusta' se agrupa un complejo de subespecies de límites genéticos confusos, históricamente confundido con *T. scripta* y *T. ornata*; conviene confirmar el único ejemplar y descartar que sea un individuo liberado. Inofensiva y sensible a la sobreexplotación.

Cómo identificarla

Tortuga acuática de caparazón pardo-oliva ovalado con cabeza y patas rayadas de amarillo; ejemplares viejos a menudo oscurecidos o melánicos.

Dónde y cuándo observarla

Espejo de agua del humedal y orillas con troncos, piedras o vegetación donde asolearse (estimado). Temporada: Registro único; mayor probabilidad de avistamiento en días soleados durante el asoleo sobre troncos u orillas.



Conocer es proteger.

Cada especie que aprendes a reconocer es una razón más para defender el humedal.

FICHA COMPLETA
en línea · fauna.chirimoyo.org



Hecho por la comunidad, para el *humedal*



Chirimoyo
HUMEDAL • ORIZABA

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS

Any Isabel Pérez Santiago (CCo)	2
Ismael Jauregui Bulbarela	CC BY-NC 2
benmun89	CC BY-NC 1
Carlos M Vieyra-Rojas	CC BY-NC 1
Francisco Castellanos	1
Genaro Sanchez	CC BY-NC 1
joabhdz	CC BY-NC 1
Luna Lunera	CC BY-NC 1
Maksymilian Wojtkiewicz	CC BY-NC 1
Tereso Hernández Morales	CC BY 1

Fotógrafos de la colección (nº de fotos). La atribución de cada foto aparece en su ficha.

FUENTES CONSULTADAS

-  **AmphibiaWeb**
UC Berkeley
-  **The Reptile Database**
reptile-database.org
-  **Enciclovida**
CONABIO · México
-  **UICN**
Estado de conservación

 **LICENCIAS** Salvo indicación contraria, las fotografías se publican bajo **CC BY-NC 4.0** y los textos bajo **CC BY-SA 4.0**. Puedes compartirlos y adaptarlos sin fines de lucro, citando a «Comunidad Chirimoyo».

CÓMO CONTRIBUIR

Defiende el humedal de Chirimoyo

-  Aprende a reconocer las especies del humedal con esta guía y el catálogo en línea.
-  Súmate a las jornadas de limpieza y reforestación de las orillas.
-  Reporta descargas, rellenos o caza al comité del humedal.



FAUNA.CHIRIMOYO.ORG
Únete al proyecto